

3M do Brasil Ltda.

Caixa Postal 123  
13081-900 – Campinas – SP  
Dept. Regulamentação  
Fone: (19) 3838-7543  
[www.3m.com.br](http://www.3m.com.br)



***NEXCARE***

*Spray*

Cada ml contém 1.30 mg de cloreto de benzalcônio e 25 mg de cloridrato de lidocaína.



**BULA PARA PACIENTE**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

3M Nexcare Antisséptico  
Cloreto de Benzalcônio e Cloridrato de Lidocaína

**APRESENTAÇÕES**

Forma farmacêutica: solução tópica – frasco plástico opaco spray 50 ml.

Cada ml contém 1.30 mg de cloreto de benzalcônio e 25 mg de cloridrato de lidocaína.

**USO EXTERNO TÓPICO**

**USO ADULTO e PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO:** Cada ml contém 1.30 mg de cloreto de benzalcônio e 25 mg de cloridrato de lidocaína.

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno e água.

**II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O 3M Nexcare Antisséptico é indicado para uso tópico para tratar ferimento. Possui ação bactericida aos microrganismos gram-positivos e ação anestésica.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento contém cloreto de benzalcônio e cloridrato de lidocaína. O cloreto de benzalcônio atua como antisséptico e “mata” as bactérias. O cloridrato de lidocaína atua como anestésico, bloqueando os impulsos nervosos aliviando a dor.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O produto é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, na gravidez e lactação. Além disso, o produto não deve ser aplicado nos olhos e mucosa.

O Antisséptico não deve ser aplicado repetidamente à pele caso qualquer hipersensibilidade ao produto se manifeste. Neste caso, descontinue o uso.  
Se as condições do ferimento não melhorarem em alguns dias, procure um médico.



**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Medicamento para uso externo. Evite contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lave imediatamente o local com água em abundância. Persistindo algum sinal/sintoma, consulte um médico. Em caso de irritação, descontinue o uso. Manter longe do alcance das crianças. Em caso de emergência médica, ligar para CEATOX do Hospital das Clínicas: fone 08000148110.

**Incompatibilidade:** Não se deve usar cloreto de benzalcônio com sabões (detergentes em geral) e outros tensoativos aniónicos. A mistura de cloreto de benzalcônio com os componentes acima por prejudicar a capacidade de diminuir ou destruir as bactérias. Pode acontecer também incompatibilidade com misturas comerciais de borracha, substâncias tais como alumínio, fluoresceína de sódio, peróxido de hidrogênio, caulim, lanolina e sulfonamidas.

**Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Manter em local seco, arejado, fresco e longe de luz. O prazo de validade do produto é de 24 meses após a data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.****

Características físicas: solução líquida na forma de spray.

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O 3M Nexcare Antisséptico é indicado para uso externo tópico.

**Modo de Usar:** Limpar o ferimento com água e sabão. Enxaguar o ferimento com água em abundância, garantindo que todo o sabão seja retirado da pele. Segure o frasco com a válvula para cima, mantendo uma distância de 5 a 10 cm do local ferido. Pressione a válvula de 2 a 3 vezes. Aplicar o produto de 3 a 4 vezes ao dia.

O produto não deve ser aplicado nos olhos e mucosa. Veja item 8 para informações sobre risco de uso por via de administração não recomendada.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A recomendação deste medicamento é que ele seja aplicado de 3 a 4 vezes ao dia. Caso haja o esquecimento aplique assim que necessário.

**3M do Brasil Ltda.**

**Caixa Postal 123**  
**13081-900 – Campinas – SP**  
**Depto. Regulamentação**  
**Fone: (19) 3838-7543**  
**www.3m.com.br**



**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Em caso de contato com os olhos pode causar irritação leve dos olhos (sinais/sintomas podem incluir vermelhidão, inchaço, dor e lacrimação).

Em caso de contato com a pele o medicamento pode ser absorvido pela pele e causar efeitos nos órgãos alvo. Não se espera que o contato com a pele durante o uso deste produto resulte em irritação significativa.

Em caso de inalação o medicamento pode ser absorvido por inalação e causar efeitos nos órgãos alvo.

Em caso de ingestão pode causar irritação gastrintestinal (sinais e sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarréia). Pode ser absorvido após ingestão e causar efeitos nos órgãos alvo.

Informações toxicológicas adicionais: Pode causar a depressão do Sistema Nervoso Central (SNC): sinais/sintomas podem incluir dor de cabeça, tonturas, sonolência, falta de coordenação, redução do tempo de reação, pronúncia indistinta, vertigens e inconsciência.

A exposição prolongada ou repetida pode causar efeitos cardíacos: sinais/sintomas podem incluir batimento cardíaco irregular (arritmia), alterações na pulsação cardíaca, dano no músculo cardíaco, ataque cardíaco e, pode ser fatal.

**Atenção: este produto é um medicamento que possui registro de nova associação no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer reações adversas ou desconhecidas. Nesse caso, informe seu médico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Caso ocorram reações indesejadas, em decorrência ao uso de uma quantidade maior do que a indicada, interrompa imediatamente o uso deste medicamento e procure um médico.

**III - DIZERES LEGAIS**

MS: 1.0207.0085

Farmacêutica Responsável: Káren A. S. Cumpri CRF-SP 24243

Fabricado por: Laboratório Tayuya Ltda.  
Av. Ampélio Gazzeta, 889  
Pq. Ind. Fritz Berzin Nova Odessa - SP  
CNPJ 60.879.848/0001-64  
Indústria Brasileira

Registrado / Comercializado por:  
**3M Produtos para Cuidados Pessoais**

**3M do Brasil Ltda.**

**Caixa Postal 123**  
**13081-900 – Campinas – SP**  
**Dept. Regulamentação**  
**Fone: (19) 3838-7543**  
**www.3m.com.br**



**3M do Brasil Ltda.**

Via Anhanguera, km 110 - Sumaré - SP  
CNPJ 45.985.371/0001-08 - Ind. Bras.

**Fale com a 3M**

0800-0132333  
www.3M.com.br  
falecom a3M@mmm.com

Essa bula foi aprovada pela ANVISA em DD/MM/AAAA.





## HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DE BULA

**3M do Brasil Ltda.**

**Caixa Postal 123  
13081-900 – Campinas – SP  
Dept. Regulamentação  
Fone: (19) 3838-7543  
www.3m.com.br**

