



Teupantol[®]

Pomada 50mg/g

Teupantol[®]

dexpantenol

APRESENTAÇÕES

Pomada 50mg/g

Embalagem contendo 1 bisnaga com 30g.

USO TÓPICO / EXTERNO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada contém:

dexpantenol (vitamina B₅).....50mg

Excipiente q.s.p.....1g

Excipientes: lanolina, petrolato branco, oleato de sorbitana, óleo de amêndoa doce, petrolato líquido, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol e água de osmose reversa.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para a cicatrização de feridas, escaras, fissuras de pele e mucosas, bem como de rachaduras.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Teupantol[®] pomada contém como princípio ativo o dexpantenol, que está incorporado em uma base oleosa. O dexpantenol penetra nas camadas internas da pele e é transformado em vitamina B₅, que estimula a formação e regeneração natural da pele. Teupantol[®] é fácil de aplicar e remover.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Teupantol[®] pomada não deve ser utilizado em indivíduos com hipersensibilidade (alergia) conhecida ao dexpantenol ou a qualquer um dos componentes do produto.

Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com hipersensibilidade conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite o contato de Teupantol[®] pomada com os olhos.

Não existem relatos sobre precauções especiais necessárias para o uso de Teupantol[®] pomada. Entretanto, podem ocorrer efeitos colaterais indesejáveis não previstos e dependentes da sensibilidade individual. Neste caso suspenda o uso do produto e informe seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Não existem relatos de interação de dexpanthenol pomada com outras substâncias.

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar a bisnaga fechada.

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do produto: pomada homogênea de cor amarela.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Teupantol[®] pomada deve ser aplicado diretamente sobre a pele limpa.

Aplicar uma camada de Teupantol[®] pomada 2 a 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de problemas na interrupção do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações alérgicas podem ocorrer em raros casos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de ingestão acidental ou proposital de quantidade excessiva de Teupantol[®] pomada, procurar serviço de urgência onde possam ser realizadas e empregadas as medidas usuais de suporte.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº 1.0370. 0591

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659



LABORATÓRIO

TEUTO BRASILEIRO S/A.

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira



Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/06/2014	0463538/14-8	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	11/06/2014	0463538/14-8	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	11/06/2014	Versão inicial	VP	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g.
10/04/2017	0583710/17-3	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/04/2017	0583710/17-3	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/04/2017	Apresentações 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?	VP	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g.
22/03/2021	-	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/03/2021	N/A	VP	-50mg/g pom derm ct bg al rev epoxi fenolico ouro x 30g.