



**Teufron<sup>®</sup>**

**Comprimido 0,5mg**

**Comprimido 1mg**

**Comprimido 2mg**

---

## MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE



# Teufon<sup>®</sup>

alprazolam

### MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

---

#### APRESENTAÇÕES

##### Comprimido 0,5mg

Embalagens contendo 10, 30, 60, 90, 200 e 500 comprimidos.

##### Comprimido 1mg

Embalagens contendo 10, 30, 60, 90, 200 e 500 comprimidos.

##### Comprimido 2mg

Embalagens contendo 10, 30, 60, 90, 200 e 500 comprimidos.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

#### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 0,5mg contém:

alprazolam.....0,5mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, dióxido de silício, croscarmelose sódica, amido, óleo vegetal hidrogenado e corante amarelo crepúsculo laca de alumínio.

Cada comprimido de 1mg contém:

alprazolam.....1mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, dióxido de silício, croscarmelose sódica, amido, óleo vegetal hidrogenado e corante de azul indigotina laca.

Cada comprimido de 2mg contém:

alprazolam.....2mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, dióxido de silício, croscarmelose sódica, amido e óleo vegetal hidrogenado.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Teufon<sup>®</sup> é indicado no tratamento de transtornos de ansiedade.

Teufron® não deve ser administrado como substituição ao tratamento apropriado de psicose (quadro de delírios e alucinações).

Os sintomas de ansiedade podem incluir de forma variável: tensão, medo, apreensão, inquietude, dificuldades de concentração, irritabilidade, insônia (dificuldade para dormir) e/ou hiperatividade neurovegetativa (respiração curta e superficial, sufocação, palpitações ou aumento dos batimentos do coração, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, enjoo, diarreia, gases, rubores (vermelhidão no rosto), calafrios, necessidade de urinar mais vezes, dificuldade de engolir, mudanças no tom de voz, etc.), resultando em manifestações corporais variadas.

Teufron® também é indicado no tratamento dos transtornos de ansiedade associados a outras condições, como a abstinência ao álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia (medo de estar em espaços abertos ou no meio da multidão), cuja principal característica é a crise de ansiedade inesperada com um ataque repentino de apreensão intensa, terror ou medo.

## **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Teufron® contém alprazolam, um medicamento da classe dos benzodiazepínicos que atuam no sistema nervoso central. A maneira como Teufron® age não é totalmente conhecida. De forma geral, todos os benzodiazepínicos causam uma diminuição em várias funções do sistema nervoso central relacionado também à dose, que pode ir desde um comprometimento leve dos reflexos e desempenho diário até o sono provocado ou quadro de sedação.

Após administração oral, alprazolam (princípio ativo de Teufron®) é rapidamente absorvido. A concentração máxima do medicamento no organismo ocorre 1 h ou 2 h após a administração. No tratamento de transtornos de ansiedade em alguns pacientes, a ação de alprazolam no alívio dos sintomas foi rápida. Uma dose administrada pela manhã pode trazer o efeito dentro de 1 h a 2 h após a administração em adultos saudáveis.

## **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você alguma vez já apresentou reação alérgica ao alprazolam, a outros benzodiazepínicos, ou a qualquer componente da fórmula do produto, não use Teufron®.

Teufron® também não deve ser usado caso você tenha miastenia gravis (uma doença de nervos e músculos que resulta em fraqueza muscular) ou glaucoma de ângulo estreito agudo (aumento da pressão dentro dos olhos).

**Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.**

## **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Recomenda-se que a dose de Teufron® seja limitada à menor dose eficaz. Portanto, não aumente a dose prescrita sem consultar seu médico, mesmo se você achar que o medicamento não está mais fazendo efeito.

A redução da dose do medicamento deve ser feita sob supervisão rigorosa e deve ser gradual. Os sintomas relacionados à interrupção repentina do medicamento incluem desde leve disforia (alterações de ânimo e irritabilidade) e insônia (dificuldade para dormir) até um conjunto de sintomas mais importantes, que inclui câibras musculares, cólicas abdominais, vômitos, sudorese (suor excessivo), tremores e convulsões (ataques epiléticos). Podem ocorrer também crises epiléticas (ataques epiléticos repetidos). Ver questão 6 - Como devo usar este medicamento? – Interrupção do Tratamento.

Se você tem problemas nos rins ou no fígado seu médico deve acompanhar seu tratamento adequadamente tomando os devidos cuidados.

Habituação (condição relacionada ao consumo repetido de um medicamento, observando-se o desejo de continuar seu uso, mas com pouca ou nenhuma tendência a aumentar a dose) e dependência emocional/física podem ocorrer com benzodiazepínicos, inclusive com Teuftron®. Assim como ocorre com todos benzodiazepínicos, o risco de dependência aumenta com doses maiores e utilização por tempo prolongado sendo ainda maior se você tem história de alcoolismo ou abuso de substâncias. Há relatos de mortes relacionadas à superdosagem quando alprazolam é utilizado com outros depressores do sistema nervoso central (SNC), incluindo opioides, outros benzodiazepínicos e álcool. O alprazolam deve ser adequadamente armazenado e descartado quando não utilizado (ver questão 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? e questão 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?).

Seu médico deve avaliar periodicamente se o tratamento com Teuftron® está sendo adequado para você.

Transtornos do pânico têm sido associados a alguns tipos de transtornos depressivos e a relatos aumentados de suicídio no caso de pacientes que não são tratados. Dessa forma, deve-se ter o mesmo cuidado quando doses mais altas de alprazolam forem utilizadas no tratamento de transtornos do pânico, assim como se tem com o uso de psicotrópicos (medicamentos com ação sobre o psiquismo) para tratar pessoas com depressão ou pessoas em que há razões para se desconfiar de planos ou pensamentos não revelados de cometer suicídio.

A administração de Teuftron® a pacientes com tendência suicida ou gravemente deprimidos deve ser realizada com as devidas precauções, utilizando as doses apropriadas prescritas pelo médico. O uso de Teuftron® não foi estabelecido em certos tipos de depressão (ver questão 1 - Para que este medicamento é indicado?).

Episódios de hipomania e mania (estados anormais de humor expansivo onde há excesso de autoconfiança, alegria, grandiosidade, desinibição, excesso de energia, falta de necessidade de sono, impulsividade, entre outros) têm sido relatados em associação com o uso de alprazolam em pessoas com depressão.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente ao seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

Este medicamento não deve ser utilizado caso você esteja amamentando.

**Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.**

Não consuma bebidas alcoólicas durante o tratamento com Teuftron®.

Não use outros remédios que diminuam o funcionamento do sistema nervoso central (como por ex.: calmantes, remédios ansiolíticos, remédios para insônia, entre outros) durante o tratamento com Teuftron®. Também não utilize Teuftron® caso esteja em uso de remédios para controle de dor da classe chamada de opioides, o uso de alprazolam com remédios dessa classe (por exemplo, tramadol) pode levar a sedação profunda, diminuição da respiração, coma e morte.

Teuftron® apresenta interações medicamentosas com uma variedade de outros medicamentos, por isso, informe seu médico se estiver tomando outros medicamentos durante o tratamento com Teuftron®, tais como cetoconazol, itraconazol, nefazodona, fluvoxamina, cimetidina, fluoxetina, propoxifeno, anticoncepcionais orais, diltiazem, antibióticos macrolídeos (como eritromicina e troleandomicina), inibidores da protease do HIV (um tipo de medicamento utilizado no tratamento da AIDS) e, especialmente se você for idoso (>65 anos), digoxina.

O alprazolam apresenta interações quando administrado com álcool ou medicamentos que produzam depressão do sistema nervoso central por ex: calmantes, ansiolíticos, remédios para

insônia, antiepilépticos, antialérgicos, entre outros que atuem sobre o sistema nervoso central, psicotrópicos, anticonvulsivantes e anti-histamínicos.

Estudos in vitro de outros benzodiazepínicos que não alprazolam sugerem uma possível interação medicamentosa com os seguintes agentes: ergotamina, ciclosporina, amiodarona, nicardipino e nifedipino. É muito importante informar ao seu médico caso esteja usando outros medicamentos antes do início ou durante o tratamento com alprazolam.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Características do medicamento:**

-Teufro<sup>®</sup> 0,5mg: Comprimido oblongo formato cápsula com vinco de cor laranja.

-Teufro<sup>®</sup> 1mg: Comprimido oblongo formato cápsula com vinco de cor azul.

-Teufro<sup>®</sup> 2mg: Comprimido circular plano com vinco em cruz de cor branca.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Uso em adultos:** A dose adequada de Teufro<sup>®</sup> deve ser individualizada e será estabelecida pelo seu médico baseada na gravidade dos sintomas e na sua resposta ao tratamento. A dose habitual (vide quadro) é suficiente para as necessidades da maioria dos pacientes. Caso sejam necessárias doses mais elevadas, essas devem ser aumentadas com cuidado, a fim de evitar reações desagradáveis.

Recomenda-se usar a menor dose eficaz, especialmente em pacientes idosos ou debilitados para evitar o desenvolvimento de sedação (sonolência) excessiva ou ataxia (dificuldade para coordenar os movimentos).

**Duração do tratamento:** Conforme os dados de estudos disponíveis, a duração do tratamento pode ser de até 6 meses para transtornos de ansiedade e de até 8 meses no tratamento dos transtornos de pânico.

**Interrupção do tratamento:** Para interromper o tratamento com Teufro<sup>®</sup>, a dose deve ser reduzida lentamente, conforme prática médica adequada. É sugerido que a dose diária de Teufro<sup>®</sup> seja reduzida em não mais que 0,5mg a cada 3 dias. Alguns pacientes podem necessitar de redução de dose ainda mais lenta (ver questão 4 – O que devo saber antes de usar este medicamento?).

**Uso em crianças:** A segurança e a eficácia de Teufro<sup>®</sup> em indivíduos com menos de 18 anos de idade não foram estabelecidas.

### Dosagem Recomendada

Indicação	Dose inicial habitual (se ocorrerem efeitos colaterais, a dosagem deve ser diminuída)	Intervalo da dose habitual
Transtornos de ansiedade	0,25mg a 0,5mg, administrados 3 vezes/dia	0,5mg a 4,0mg ao dia, administrados em doses divididas.
Transtorno do pânico	0,5mg a 1,0mg antes de dormir ou 0,5mg, administrados 3 vezes/dia	A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta do paciente. Os ajustes de dose devem ser aumentados no máximo 1mg a cada 3 ou 4 dias. Com Teuftron®, doses adicionais podem ser acrescentadas até que seja alcançada uma posologia de 3 ou 4 vezes diariamente. A dose média em um grande estudo multicêntrico foi $5,7 \pm 2,27$ mg, com pacientes necessitando, ocasionalmente, de um máximo de 10mg diariamente.
Pacientes geriátricos ou na presença de condições debilitantes	0,25mg administrados 2 ou 3 vezes/dia	0,5mg a 0,75mg ao dia, administrados em doses divididas; podem ser gradualmente aumentadas se necessário e tolerado.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você se esqueça de tomar Teuftron® no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento em dobro para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Os eventos adversos de alprazolam, se presentes, geralmente são observados no início do tratamento e habitualmente desaparecem com a continuidade do tratamento ou diminuição da dose.

Informe ao seu médico o aparecimento de qualquer reação desagradável durante o tratamento com Teuftron®.

Os eventos adversos associados ao tratamento com Teuftron® em pacientes participantes de estudos clínicos controlados e/ou em experiências pós-comercialização são os seguintes:

**Reações muito comuns** (ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam esse medicamento): depressão, sedação, sonolência, ataxia (dificuldade na coordenação motora), comprometimento da memória, disartria (fala empastada), tontura, cefaleia (dor de cabeça), constipação, boca seca, fadiga (cansaço) e irritabilidade.

**Reações comuns** (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento): diminuição do apetite, confusão, desorientação (confusão mental), diminuição da libido (desejo sexual), ansiedade, insônia (dificuldade para dormir), nervosismo, aumento da libido (desejo sexual), perturbação do equilíbrio, coordenação anormal, distúrbios de atenção, hipersonia (aumento do sono), letargia (diminuição das funções vitais), tremor, visão turva, náusea, dermatite (inflamação da pele), disfunção sexual, diminuição do peso e aumento do peso.

**Reações incomuns** (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento): mania (estado de euforia) (Ver questão 4 - O que devo saber antes de usar este medicamento?), alucinações, raiva, agitação, dependência a substâncias, amnésia, fraqueza muscular (dos músculos), incontinência urinária (dificuldade de controlar a urina), irregularidades menstruais e síndrome de abstinência a substâncias.

**Frequência desconhecida** (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis): hiperprolactinemia (aumento da prolactina no sangue), hipomania, agressividade, hostilidade, pensamento anormal, hiperatividade psicomotora, abuso de substâncias, desequilíbrio autonômico do sistema nervoso (manifestações do sistema nervoso autônomo, como aumento da frequência cardíaca, hipotensão ao ficar em pé, dilatação da pupila, entre outros), distonia (contração involuntária da musculatura, lenta e repetitiva) alterações gastrintestinais (do sistema digestivo), hepatite (inflamação do fígado), função hepática anormal (problemas no fígado), icterícia (pele e mucosas amareladas), angioedema (inchaço das mucosas que pode acometer as vias aéreas), reação de fotossensibilidade (sensibilidade exagerada da pele à luz), retenção urinária, edema periférico (inchaço dos membros), e aumento da pressão intraocular (aumento da pressão dentro do olho).

Foram relatados casos de irritabilidade, hostilidade e pensamentos invasivos durante a interrupção da administração de Teufon<sup>®</sup> em pacientes com distúrbio de estresse pós-traumático.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

No caso de superdose, os seguintes sintomas podem ocorrer: sonolência, fala arrastada, comprometimento da coordenação motora, coma e depressão respiratória (redução da função do sistema respiratório que pode reduzir a quantidade de oxigênio no sangue e em todo corpo). Sequelas graves são raras, exceto quando há ingestão de Teufon<sup>®</sup> junto com outros medicamentos e/ou álcool.

O tratamento de superdose é principalmente de suporte para a função respiratória e cardiovascular. O valor da diálise não foi determinado. Como em todos os casos de superdose intencional de qualquer fármaco, deve-se ter em mente que múltiplos agentes podem ter sido ingeridos.

O flumazenil pode ser usado como um adjuvante para a administração das funções respiratórias e cardiovasculares associadas a superdose.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

M.S. nº 1.0370.0659

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659



**LABORATÓRIO TEUTO  
BRASILEIRO S/A.**

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira



**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

**O ABUSO DESTES MEDICAMENTOS PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 11/04/2019.**



## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
16/11/2015	0998001/15-6	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambialidade	16/11/2015	0998001/15-6	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambialidade	16/11/2015	Identificação do Medicamento	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
13/04/2016	1550977/16-0	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	13/04/2016	1550977/16-0	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	13/04/2016	Versão inicial	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp).

									-0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
22/06/2016	1966804/16-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/06/2016	1966804/16-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/06/2016	1. Para que este medicamento é indicado? 2. Como este medicamento funciona? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? 9. Que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90.

									-2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
23/11/2018	1109880/18-5	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/11/2018	1109880/18-5	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/11/2018	Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento? Restrição de venda	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
17/05/2019	0440080/19-1	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	17/05/2019	0440080/19-1	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	17/05/2019	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500

									(emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
20/01/2021	0258353/21-4	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	20/01/2021	0258353/21-4	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	20/01/2021	6. Como devo usar este medicamento?	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200

									(emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).
09/03/2021	-	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	09/03/2021	-	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	09/03/2021	N/A	VP	-0,5 mg com ct bl x 10. -0,5 mg com ct bl x 30. -0,5 mg com ct bl x 60. -0,5 mg com ct bl x 90. -0,5 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -0,5 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 10. -1,0 mg com ct bl x 30. -1,0 mg com ct bl x 60. -1,0 mg com ct bl x 90. -1,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -1,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 10. -2,0 mg com ct bl x 30. -2,0 mg com ct bl x 60. -2,0 mg com ct bl x 90. -2,0 mg com ct bl x 200 (emb hosp). -2,0 mg com ct bl x 500 (emb hosp).