

hemitartrato de rivastigmina

Instituto Vital Brazil S/A

cápsula dura

1,5 mg / 3,0 mg / 4,5 mg / 6,0 mg

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

hemitartarato de rivastigmina

Medicamento Genérico, Lei nº 9.787 de 1999

APRESENTAÇÕES

Cápsulas de 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg e 6,0 mg.

Embalagens contendo 30 ou 60 cápsulas.

Embalagem hospitalar contendo 600 cápsulas.

VIA ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de 1,5 mg contém:

hemitartarato de rivastigmina* 2,399 mg

excipiente** q.s.p. 1 cáp.

* cada 2,399 mg de hemitartarato de rivastigmina equivalem a 1,5 mg de rivastigmina.

** Excipientes: Hipromelose, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, dióxido de titânio e gelatina.

Cada cápsula de 3,0 mg contém:

hemitartarato de rivastigmina* 4,799 mg

excipiente** q.s.p. 1 cáp.

* cada 4,799 mg de hemitartarato de rivastigmina equivalem a 3,0 mg de rivastigmina.

** Excipientes: Hipromelose, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, dióxido de titânio, gelatina, corante azul e corante vermelho (eritrosina).

Cada cápsula de 4,5 mg contém:

hemitartarato de rivastigmina* 7,198 mg

excipiente** q.s.p. 1 cáp.

* cada 7,198 mg de hemitartarato de rivastigmina equivalem a 4,5 mg de rivastigmina.

** Excipientes: Hipromelose, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, dióxido de titânio, gelatina, corante azul e corante óxido de ferro amarelo.

Cada cápsula de 6,0 mg contém:

hemitartarato de rivastigmina* 9,597 mg

excipiente** q.s.p. 1 cáp.

* cada 9,597 mg de hemitartarato de rivastigmina equivalem a 6,0 mg de rivastigmina.

** Excipientes: Hipromelose, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, dióxido de titânio, gelatina, corante azul, corante óxido de ferro amarelo, corante vermelho (eritrosina) e corante amarelo.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O hemitartarato de rivastigmina é usado no tratamento de problemas de memória e demência em pacientes com doença de Alzheimer ou doença de Parkinson.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O hemitartarato de rivastigmina pertence a uma classe de substâncias conhecida como inibidores da colinesterase.

O hemitartarato de rivastigmina tem como substância ativa a rivastigmina que age aumentando a quantidade de acetilcolina no cérebro, substância que é necessária para um bom funcionamento cognitivo, como por exemplo, o aprendizado, a memória, a compreensão e a orientação, bem como a habilidade do paciente de lidar com situações do cotidiano. Agindo dessa maneira, o hemitartarato de rivastigmina

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

ajuda a diminuir o declínio mental que ocorre em pacientes com a doença de Alzheimer ou com a doença de Parkinson.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome hemitarato de rivastigmina:

- se você souber que é alérgico (hipersensível) à rivastigmina (substância ativa de hemitarato de rivastigmina) ou a qualquer outro componente da fórmula;
- se você já teve uma reação alérgica a algum medicamento similar a este.

Se isso aplicar a você, não use o hemitarato de rivastigmina e informe ao seu médico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Tome um cuidado especial com hemitarato de rivastigmina:

- caso você apresente reações gastrintestinais, como náuseas (se sentir enjoado), vômitos e diarreia. Você poderá ficar desidratado (perder muito líquido) se os vômitos ou a diarreia forem prolongados;
- se você tem ou tenha tido batimentos cardíacos irregulares (palpitação ou bradicardia), insuficiência cardíaca descompensada, infarto do miocárdio recente, baixo nível de potássio ou magnésio no sangue, histórico pessoal ou familiar de prolongamento do intervalo QT;
- se você tem ou tenha tido úlcera gástrica ativa;
- se você tem ou tenha tido obstrução urinária (dificuldade para urinar);
- se você tem ou tenha tido convulsões (ataques ou crises epilépticas);
- se você tem ou tenha tido asma ou doença respiratória grave;
- se você sofre de tremores;
- se você tem um baixo peso corporal (menos de 50kg);
- se você tem problemas nos rins e fígado.

Se algum destes itens se aplicar a você, seu médico pode precisar monitorá-lo mais proximamente durante o uso deste medicamento.

Converse com seu médico imediatamente se você tiver uma inflamação da pele, bolhas ou inchaço da pele que estão aumentando e se espalhando.

Se você passou por um período de mais do que três dias sem tomar o hemitarato de rivastigmina, não tome a próxima dose sem antes conversar com o seu médico.

Pessoas idosas (com idade de 65 anos ou mais)

O hemitarato de rivastigmina pode ser usado em pacientes idosos.

Crianças e adolescentes

O uso de hemitarato de rivastigmina em crianças e adolescentes não foi estudado e, portanto, não é recomendado.

Dirigir e operar máquinas

Seu médico irá informá-lo se a sua doença o permite dirigir veículos e operar máquinas com segurança. O hemitarato de rivastigmina pode causar tontura e sonolência, principalmente no início do tratamento e quando há aumento de dose. Portanto, você deve aguardar e certificar-se sobre os efeitos que o medicamento pode lhe causar, antes de se arriscar em tais atividades. Se sentir tonturas ou sonolência, não dirija, utilize máquinas ou realize outras tarefas que requeiram sua atenção.

Gravidez e lactação

Em caso de gravidez, os benefícios do hemitarato de rivastigmina devem ser avaliados contra os possíveis efeitos sobre o feto. Informe ao seu médico se estiver grávida ou se planeja engravidar.

Você não deve amamentar durante o tratamento com o hemitarato de rivastigmina.

Peça orientações ao seu médico ou farmacêutico, antes de tomar qualquer medicamento durante a gravidez ou amamentação.

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Informe ao seu médico ou farmacêutico sobre qualquer outro medicamento que esteja utilizando ou que tenha utilizado recentemente, incluindo os que você comprou sem prescrição médica.

Hemitartarato de rivastigmina não deve ser administrado junto com outros medicamentos com efeito similar à rivastigmina (agentes colinomiméticos) ou com medicamentos anticolinérgicos (tais como medicamentos utilizados para aliviar cólicas ou espasmos do estômago ou para evitar o enjoo em viagem).

Hemitartarato de rivastigmina não deve ser administrado em conjunto com metoclopramida (um medicamento usado para aliviar ou prevenir náuseas e vômitos). Pode haver efeitos aditivos, tais como rigidez nos membros e mãos trêmulas.

Se você tiver que se submeter a uma cirurgia durante o tratamento com o hemitarato de rivastigmina, informe ao seu médico antes de receber qualquer anestesia, pois o hemitarato de rivastigmina pode exacerbar os efeitos de alguns relaxantes musculares durante a anestesia.

Cuidado quando o hemitarato de rivastigmina é administrado junto com betabloqueadores (medicamentos, tais como atenolol usado para tratar a hipertensão, angina e outros problemas cardíacos). Podem ocorrer efeitos aditivos como bradicardia (diminuição do ritmo do coração), que pode resultar em síncope (desmaio, perda de consciência).

Deve-se ter precaução quando hemitarato de rivastigmina é tomado juntamente com medicamentos conhecidos por induzir o prolongamento do intervalo QT e/ou torsade de pointes (incluindo, entre outros, a quinidina (medicamento usado para tratar batimentos cardíacos irregulares), amiodarona (medicamento usado para tratar batimentos cardíacos irregulares graves/fatais), pimozida (medicamento atua no sistema nervoso central), halofantrina (medicamento antimarial), cisaprida (medicamento usado para tratar sintomas de refluxo gastroesofágico), citalopram (medicamento usado para tratar depressão), mizolastina (medicamento anti-histamínico) e medicamentos usados para tratar infecções bacterianas como moxifloxacino e eritromicina). Se algum destes casos se aplicar a você, seu médico pode precisar monitorá-lo mais proximamente durante o uso de hemitarato de rivastigmina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

As cápsulas devem ser conservadas em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas:

hemitarato de rivastigmina 1,5 mg: Cápsula de gelatina dura, na cor branca, contendo granulado na cor branca.

hemitarato de rivastigmina 3,0 mg: Cápsula de gelatina dura, na cor roxo e branco, contendo granulado na cor branca.

hemitarato de rivastigmina 4,5 mg: Cápsula de gelatina dura, na cor verde e branco, contendo granulado na cor branca.

hemitarato de rivastigmina 6,0 mg: Cápsula de gelatina dura, na cor caramelo e rosa, contendo granulado na cor branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Siga cuidadosamente todas as instruções dadas pelo seu médico. Não exceda a dose recomendada.

Como tomar o hemitartrato de rivastigmina

Engula as cápsulas inteiras com líquido, sem abrir ou mastigar.

Quanto tomar do hemitartrato de rivastigmina

Seu médico irá indicar a dose do hemitartrato de rivastigmina que você deverá tomar, começando com uma dose baixa e aumentando gradualmente, dependendo da sua resposta ao tratamento. A dose máxima permitida é de 6 mg duas vezes ao dia.

Quando tomar o hemitartrato de rivastigmina

Você deve tomar o hemitartrato de rivastigmina duas vezes ao dia, uma vez no café da manhã e outra no jantar. Tomar o hemitartrato de rivastigmina no mesmo horário todos os dias o ajudará a lembrar quando tomar o medicamento.

Por quanto tempo tomar o hemitartrato de rivastigmina

Para ter os benefícios do medicamento, você deve tomá-lo todos os dias.

Informe ao seu cuidador que você está tomando hemitartrato de rivastigmina. Informe também se você não estiver tomando hemitartrato de rivastigmina por mais do que três dias.

A prescrição deste medicamento precisa de aconselhamento especializado antes do seu início e uma avaliação periódica dos benefícios terapêuticos. Seu médico também irá monitorar seu peso enquanto estiver utilizando este medicamento.

Se você tem dúvidas sobre quanto tempo deverá tomar hemitartrato de rivastigmina, fale com seu médico ou farmacêutico.

A duração do tratamento dependerá da resposta ao medicamento. Portanto, a posologia deverá ser orientada exclusivamente pelo seu médico.

Se você parar de tomar hemitartrato de rivastigmina

Não pare de tomar hemitartrato de rivastigmina ou altere a dose sem o conhecimento do seu médico. Somente o médico poderá avaliar a eficácia da terapia.

Caso você esteja há mais do que três dias sem tomar hemitartrato de rivastigmina, não tome a próxima dose sem antes conversar com o seu médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar uma dose do hemitartrato de rivastigmina, aguarde para tomar a próxima dose no horário usual. Não tome o dobro da dose do hemitartrato de rivastigmina para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Assim como com todos os medicamentos, os pacientes que tomam hemitartrato de rivastigmina podem experimentar efeitos secundários, embora nem todas as pessoas os apresentem.

Não se assuste com essa lista de possíveis efeitos adversos. Você pode não apresentar nenhum deles.

Esses efeitos tendem a ser mais frequentes quando você inicia a medicação ou passa para uma dosagem maior. As reações adversas desaparecem aos poucos, muito provavelmente porque seu corpo acostuma-se com o medicamento.

As reações adversas podem ocorrer com determinadas frequências, que são definidas como segue:

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | |
|---------------|---|
| Muito comum: | afeta mais de 1 em 10 pacientes |
| Comum: | afeta entre 1 e 10 a cada 100 pacientes |
| Incomum: | afeta entre 1 e 10 a cada 1.000 pacientes |
| Rara: | afeta entre 1 e 10 a cada 10.000 pacientes |
| Muito rara: | afeta menos de 1 a cada 10.000 pacientes |
| Desconhecida: | a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis |

Reações adversas muito comuns e comuns

Muito comuns (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): se sentir enjoado (reações gastrintestinais tais como náusea), vômito, diarreia, tontura e perda de apetite.

Comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): agitação, confusão, pesadelos, ansiedade, dor de cabeça, sonolência, dores de estômago, desconforto no estômago após as refeições, fraqueza, sensação de mal-estar, fadiga, transpiração excessiva, perda de peso e tremor. Informe ao seu médico caso estes efeitos desagradáveis persistam.

Algumas reações adversas podem ser sérias

Incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): depressão e desmaio.

Raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): ataques ou crise epiléptica (convulsões), dor no peito, forte dor no peito (ataque cardíaco) e úlceras gástrica ou duodenal.

Muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): alucinações, problemas com o ritmo cardíaco (batimento acelerado ou retardado), sangue na evacuação ou ao vomitar (hemorragia gastrintestinal), dor intensa na parte superior do estômago, frequentemente com náusea e vômito (inflamação do pâncreas), vômito grave que pode levar à ruptura do esôfago.

Frequência desconhecida: perda de muito líquido (desidratação), pele amarela, amarelamento do branco dos olhos, escurecimento anormal da urina ou náuseas inexplicadas, vômitos, cansaço e perda de apetite (distúrbios hepáticos), inflamação da pele, bolhas ou inchaço da pele que estão aumentando e se espalhando, membros rígidos, mãos trêmulas (sintomas extrapiramidais).

Se você apresentar qualquer uma destas reações, pare de tomar o hemitartrato de rivastigmina e procure um médico imediatamente.

Outras reações adversas

Incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dificuldade para dormir, alterações nos resultados dos testes de função hepática e quedas acidentais.

Raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): erupções da pele e prurido (coceira).

Muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): pressão alta, infecção do trato urinário (dor para urinar), rigidez muscular, dificuldade em administrar movimentos (agravamento dos sintomas da doença de Parkinson ou desenvolvimento de sintomas similares).

Frequência desconhecida: agressividade, síndrome de Stevens-Johnson e agitação.

Se você apresentar qualquer uma destas reações de forma grave, informe ao seu médico.

Informações adicionais para pacientes com doença de Parkinson

Algumas reações adversas são menos frequentes em pacientes com demência associada à doença de Parkinson: perda de apetite, tontura e diarreia (comum).

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

Algumas reações adversas são mais frequentes em pacientes com demência associada à doença de Parkinson: tremores, quedas accidentais (muito comum), perda de muito líquido (desidratação) dificuldade em dormir, agitação, agravamento dos sintomas da doença de Parkinson ou desenvolvimento de sintomas similares (movimentos lentos anormais, movimentos incontroláveis da boca, língua e membros, rigidez muscular, diminuição anormal dos movimentos musculares), batimento cardíaco lento, pressão arterial alta (comum), postura anormal com controle pobre de movimentos e problemas com ritmo cardíaco (rápidos e lentos) (incomum).

Algumas reações adversas adicionais em pacientes com demência associada à doença de Parkinson são: salivação excessiva, modo de caminhar anormal, tontura e dor de cabeça leve devido à pressão arterial baixa (comum).

Adicionalmente, informe ao seu médico ou farmacêutico se você apresentar qualquer outra possível reação adversa não listada na bula.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico se você tomar accidentalmente mais hemitartrato de rivastigmina do que foi indicado. Você poderá precisar de cuidados médicos. Algumas pessoas que tomaram accidentalmente muito hemitartrato de rivastigmina tiveram náusea, vômito, diarreia, pressão alta e alucinações. Batimento cardíaco lento e desmaios também podem ocorrer.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Reg. M.S.: 1.0407.0103

Farm. Resp.: Dr. Jorge Luiz Coelho Mattos

CRF-RJ nº 3083

Registrado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

EMS S/A.

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 - Chácara Assay - Hortolândia – SP

OU

Registrado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

EMS S/A.

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 - Chácara Assay - Hortolândia – SP

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

Fabricado e embalado por:

LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Gravataí, nº 20 - Jacaré - Rio de Janeiro – RJ

OU

Registrado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Gravataí, nº 20 - Jacaré - Rio de Janeiro – RJ

OU

Registrado e embalado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

EMS S/A.

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 - Chácara Assay - Hortolândia – SP

OU

Registrado e embalado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Gravataí, nº 20 - Jacaré - Rio de Janeiro – RJ

OU

Registrado e embalado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Gravataí, nº 20 - Jacaré - Rio de Janeiro – RJ

Fabricado por:

EMS S/A.

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 - Chácara Assay - Hortolândia – SP

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

OU

Registrado e embalado por:

INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A.

Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil - Niterói - RJ

CNPJ: 30.064.034/0001-00

Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:

EMS S/A.

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 - Chácara Assay - Hortolândia – SP

Fabricado por:

LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Rua Gravataí, nº 20 - Jacaré - Rio de Janeiro – RJ

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO.

SAC: 0800 022 1036

sac@vitalbrazil.rj.gov.br

www.vitalbrazil.rj.gov.br

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 06/03/2023.



47935 - 10268 - VP7

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica | | | Dados da petição/notificação que altera bula | | | | Dados das alterações de bulas | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|
| Data do expediente | Nº do expediente | Assunto | Data do expediente | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas |
| 11/03/2016 | 13513721-69 | (10459) – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12 | 11/03/2016 | 1351372/16-9 | (10459) – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12 | 11/03/2016 | Submissão eletrônica para disponibilização do texto de bula no bulário eletrônico da ANVISA. | VP1 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|--|-----|--|
| 29/06/2016 | 2002606/16-4 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 29/06/2016 | 2002606/16-4 | (10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 29/06/2016 | 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? | VP2 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| | | | | | | | | | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---|------------|----------------------|-----|--|
| 30/05/2018 | 0438638/18-8 | (10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 09/05/2018 | 0364980/18-6 | (11010) - RDC 73/2016 - GENÉRICO - Inclusão de local de embalagem secundária do medicamento | 09/05/2018 | III – Dizeres Legais | VP3 | AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| 27/02/2020 | 0595144/20-5 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 09/05/2018 | 0364980/18-6 | (11010) - RDC 73/2016 - GENÉRICO - Inclusão de local de embalagem secundária do medicamento | 09/05/2018 | III – Dizeres Legais | VP4 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 |

VP7 = Hemitartarato de Rivastigmina_Bula_Paciente

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---|------------|--|-----|---|
| | | | | | | | | | 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| 19/03/2021 | 1069741/21-1 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 09/05/2018 | 0364980/18-6 | (11010) - RDC 73/2016 - GENÉRICO - Inclusão de local de embalagem secundária do medicamento | 09/05/2018 | Retirada das aspas da frase “Medicamento Genérico, Lei nº 9.787 de 1999” III – Dizeres Legais | VP5 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 |

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----|----|----|----|---|-----|---|
| | | | | | | | | | 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| 13/06/2022 | 4288443/22-9 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | NA | NA | NA | NA | 5. Onde, Como e Por Quanto Tempo Posso Guardar este Medicamento? III – Dizeres Legais | VP5 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 |
| | | | | | | | | | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |

VP7 = Hemitartarato de Rivastigmina_Bula_Paciente

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----|----|----|----|---|-----|--|
| 20/06/2022 | 4314360/22-4 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | NA | NA | NA | NA | 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? | VP6 | 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| 31/08/2023 | 0928815/23-4 | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | NA | NA | NA | NA | 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? | VP7 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |

VP7 = Hemitartrato de Rivastigmina_Bula_Paciente

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|---|-----|---|---|
| | | | | | | | | | PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
| - | NA | (10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | NA | NA | NA | Correção gramatical III – Dizeres Legais | VP7 | 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 1,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 3,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 4,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) | |

VP7 = Hemitartrato de Rivastigmina_Bula_Paciente

Bula para Paciente

Bula de acordo com a Resolução - RDC/ANVISA nº 47/2009

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 60 6,0 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 600 (EMB HOSP) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|