



Bula  
PACIENTE

**BACTROPIN<sup>®</sup>**  
sulfametoxazol + trimetoprima

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

COMPRIMIDO

400 MG + 80 MG



## Bula PACIENTE

### I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

#### **Bactropin®**

sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima 80 mg

#### **MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA**

**Agente quimioterápico com duplo mecanismo de ação e propriedades bactericidas.  
Antibacteriano para uso sistêmico.**

#### **APRESENTAÇÃO**

Embalagem com 20 comprimidos

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém:

sulfametoxazol..... 400 mg

trimetoprima..... 80 mg

Excipientes\*q.s.p.:..... 1 comprimido

\*estearato de magnésio, docusato de sódio, povidona e amidoglicolato de sódio.

### II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações a seguir. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Bactropin®** é indicado para o tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis à associação dos medicamentos trimetoprima e sulfametoxazol, como certas infecções respiratórias, gastrintestinais, renais e do trato urinário, genitais (homens e mulheres), infecções da pele, entre outros tipos de infecções.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**Bactropin®** é um quimioterápico (medicamento sintetizado em laboratório para combater microrganismos ou a multiplicação desordenada de células), com propriedades bactericidas (capaz de matar bactérias) e duplo mecanismo de ação.

**Bactropin®** contém dois compostos ativos (sulfametoxazol + trimetoprima), que agem sinergicamente (ação conjunta, em que uma substância potencializa a outra), inibindo dois passos consecutivos da formação de uma substância necessária aos microrganismos, que não conseguem mais se desenvolver.

A ação medicamentosa de **Bactropin®** começa logo após a primeira dose. No entanto, os microrganismos não são eliminados de imediato. Por isso, mesmo que alguns sintomas, como febre, dor, etc. desapareçam, é necessário continuar o tratamento pelo período estabelecido pelo seu médico.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Bactropin®** não deve ser utilizado por pacientes com doença grave no fígado e no rim. Também está contraindicado a pacientes com alergia à sulfonamida, à trimetoprima ou a qualquer um dos componentes da formulação.

**Bactropin®** não deve ser utilizado em combinação com dofetilida (medicamento contra arritmias do coração) (vide item *O que devo saber antes de usar este medicamento? – Interações medicamentosas*).

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Deve-se ter cuidados especiais com pacientes idosos e com problemas no rim e no fígado, nos quais há maior probabilidade de ocorrer efeitos indesejáveis relacionados à dose ou à duração do tratamento. Em pacientes idosos ou



## Bula PACIENTE

com história de deficiência de ácido fólico ou insuficiência renal, podem ocorrer alterações hematológicas (no sangue) indicativas de deficiência de ácido fólico. Essas alterações são reversíveis administrando-se ácido fólico.

Para diminuir esses efeitos, recomenda-se que a duração do tratamento seja a menor possível para o paciente idoso. Em caso de comprometimento renal, a dose deve ser ajustada. Pacientes em uso prolongado devem fazer exames de sangue e urina regularmente.

O tratamento deve ser descontinuado imediatamente caso você observe sinais de aparecimento de erupção cutânea ou qualquer outra reação adversa grave.

**Bactropin®** deve ser administrado com cautela em pacientes com história de alergia grave e asma brônquica.

Infiltrados pulmonares (alterações nos pulmões identificadas em radiografias), tais como ocorrem em alveolite (inflamação dos alvéolos, pequenos sacos aéreos que se enchem de ar durante a respiração) alérgica ou eosinofílica (por um tipo de glóbulo branco), têm sido relatados. Esses podem se manifestar por meio de sintomas como tosse ou respiração ofegante. Se tais sintomas aparecerem ou, inexplicavelmente, piorarem, o paciente deve ser reavaliado e a descontinuação da terapia com **Bactropin®** deve ser considerada.

**Bactropin®** não deve ser utilizado por pacientes com sérias alterações hematológicas (no sangue) nem por pacientes portadores de deficiência de G6PD (desidrogenase de glicose-6-fosfato), a não ser em casos de absoluta necessidade e em doses mínimas.

Como com todos os medicamentos que contêm sulfonamidas (como o sulfametoxazol), deve-se ter cautela com pacientes com porfiria (doença que apresenta irregularidade no metabolismo da hemoglobina, pigmento responsável pela cor vermelha do sangue) ou disfunção da tireoide.

**Bactropin®** pode aumentar a excreção urinária, particularmente em pacientes com edema (retenção de líquidos) de origem cardíaca.

Pacientes com insuficiência renal grave (ou seja, com depuração da creatinina 15-30 mL/min) que estão recebendo sulfametoxazol-trimetoprima devem ser monitorados quanto aos sinais e sintomas de toxicidade, tais como náuseas, vômitos e hipercalemia (elevação do potássio no sangue).

Altas doses de TMP, como as usadas em pacientes com pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, induzem a um progressivo, mas reversível, aumento da concentração de potássio sérico em um número substancial de pacientes. Mesmo doses recomendadas de TMP podem causar hipercalemia, quando administradas em pacientes com doenças subjacentes do metabolismo do potássio, insuficiência renal ou que estejam recebendo drogas que provocam hipercalemia. É indicado monitoramento rigoroso do potássio sérico nesses pacientes.

### Gravidez e lactação:

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Você deve informar ao seu médico caso ocorra gravidez durante o tratamento ou logo após o seu término.

Dois estudos sugeriram um aumento de 2 a 3,5 vezes do risco de aborto espontâneo em mulheres tratadas apenas com trimetoprima e em combinação com sulfametoxazol durante o primeiro trimestre em comparação com nenhuma exposição a antibióticos ou exposição a penicilinas.

Uma vez que os dois compostos de **Bactropin®** atravessam a barreira placentária, eles podem vir a interferir no metabolismo do ácido fólico do feto, devendo ser usado na gestação somente se o risco para o feto for justificado pelo benefício para a gestante. Caso haja necessidade de uso, todas as gestantes, ou mulheres que pretendem engravidar, devem receber concomitantemente 5 mg de ácido fólico diariamente durante o tratamento com **Bactropin®**. Deve-se evitar o uso de **Bactropin®** no último trimestre de gestação, a não ser que não exista nenhuma alternativa, devido ao risco do recém-nascido apresentar problemas neurológicos devido ao acúmulo de bilirrubina no cérebro (kernicterus).

Os dois compostos de **Bactropin®** são excretados pelo leite, devendo-se levar em consideração os riscos já citados acima. Informe ao seu médico se está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação, exceto sob orientação médica.

Até o momento, não há informações de que **Bactropin®** (sulfametoxazol + trimetoprima) possa causar *doping*.

Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

### Interações medicamentosas



## Bula PACIENTE

Devido à possibilidade de interação medicamentosa, você deve ter cautela com o uso concomitante de **Bactropin**<sup>®</sup> e os medicamentos ou substâncias descritas a seguir:

- diuréticos (medicamentos que aumentam a quantidade de urina eliminada) e digoxina (medicamento para o coração);
- medicamentos para doenças do sistema nervoso: depressores do sistema nervoso central, como, por exemplo, antidepressivos e fenitoína;
- medicamentos que contenham em sua fórmula: amantadina (medicamento antiviral e antiparkinsoniano), lamivudina (antirretroviral utilizado em pacientes portadores de HIV), ou memantina (utilizado em doença de *Alzheimer*), antidiabéticos orais, ciclosporina (usada em transplantes, por exemplo), indometacina (usada em doenças reumatológicas, por exemplo) metotrexato (usado em doenças reumatológicas, por exemplo), pirimetamina (usada em infecções, como toxoplasmose, por exemplo) e varfarina (anticoagulante).

Há evidências de que a trimetoprima interage com a dofetilida, portanto, **Bactropin**<sup>®</sup> não deve ser administrado em combinação com esse fármaco.

A exposição sistêmica a medicamentos metabolizados pelas enzimas do fígado (citocromo P450 2C8) pode aumentar quando administrado com trimetoprima (TMP) e sulfametoxazol (SMZ). Exemplos incluem paclitaxel (oncológico), amiodarona (usado em arritmias cardíacas), dapsona (usado em doenças de pele), repaglinida, rosiglitazona e pioglitazona (usados em diabetes).

### **Interações farmacodinâmicas e interações de mecanismo indefinido**

A taxa de incidência e gravidade das reações adversas mielotóxicas e nefrotóxicas pode aumentar quando TMP-SMZ é administrado concomitantemente com outros medicamentos mielossupressores ou associados à disfunção renal, como análogos de nucleosídeos, tacrolimus, azatioprina ou mercaptopurina. Pacientes que recebem TMP-SMZ concomitantemente com tais medicamentos devem ser monitorados quanto à toxicidade hematológica e/ou renal.

A administração em conjunto com a clozapina (usado em esquizofrenia), uma substância conhecida por ter grande potencial para causar agranulocitose (diminuição dos glóbulos brancos), deve ser evitada.

Devido aos efeitos poupadores de potássio de TMP e SMZ, cuidado deve ser tomado quando TMP e SMZ é administrado com outros agentes que aumentam o potássio sérico, tais como inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina, diuréticos poupadores de potássio e prednisolona.

### **Interferência em exames de laboratório**

**Bactropin**<sup>®</sup>, especialmente o componente TMP, pode interferir na dosagem do metotrexato sérico, dependendo da técnica utilizada para medição do fármaco.

A presença de TMP e SMZ pode também interferir na dosagem de creatinina, ocasionando aumento de cerca de 10% nos valores da faixa de normalidade.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Bactropin**<sup>®</sup> comprimidos deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto:

Comprimido branco, circular e biconvexo.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**



## Bula PACIENTE

Os comprimidos de **Bactropin**<sup>®</sup> devem ser administrados por via oral, pela manhã e à noite, de preferência após uma refeição e com quantidade suficiente de líquido.

A posologia deve ser orientada pelo seu médico, de acordo com a sua doença. No entanto, as doses usualmente recomendadas para **Bactropin**<sup>®</sup> comprimidos são:

**Adultos e crianças a partir de 12 anos:**

Dose habitual: 2 comprimidos de **Bactropin**<sup>®</sup> a cada 12 horas.

Dose mínima e dose para tratamento prolongado (mais de 14 dias): 1 comprimido de **Bactropin**<sup>®</sup> a cada 12 horas.

Dose máxima (casos especialmente graves): 3 comprimidos de **Bactropin**<sup>®</sup> a cada 12 horas.

### **Duração do tratamento**

Em infecções agudas, **Bactropin**<sup>®</sup> deve ser administrado por, pelo menos, cinco dias ou até que o paciente esteja sem a presença de sintomas por, pelo menos, dois dias. Se a melhora clínica não for evidente após sete dias de tratamento, o paciente deve ser reavaliado.

Esquemas de tratamento especiais podem ser recomendados em determinadas doenças e condições clínicas dos pacientes. O seu médico saberá identificar essas situações e adotar o esquema de doses adequado.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar alguma das doses prescritas, espere até o horário da dose seguinte e retorne ao seu esquema de tratamento habitual. Não tome uma dose dobrada para compensar a que você esqueceu.

**Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Nas doses recomendadas, **Bactropin**<sup>®</sup> é geralmente bem tolerado. Os efeitos colaterais mais comuns são erupções cutâneas e distúrbios gastrointestinais.

Entretanto, efeitos colaterais adicionais já foram descritos em frequência variável em pacientes expostos à medicação. As categorias utilizadas como padrões de frequência (número de eventos relatados / número de pacientes expostos à medicação) são as seguintes:

Muito comum  $\geq 1/10$ ; comum  $\geq 1/100$  e  $< 1/10$ ; incomum  $\geq 1/1.000$  e  $< 1/100$ ; raro  $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ ; e muito raro  $< 1/10.000$ . Desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

**Efeitos adversos relatados em pacientes tratados com trimetoprima + sulfametoxazol:**

#### **CLASSE DE SISTEMA ORGÂNICO:**

##### **Distúrbios do sangue e sistema linfático**

**Raro:** Leucopenia (redução dos glóbulos brancos do sangue), granulocitopenia, trombocitopenia, anemia (megaloblástica, hemolítica / autoimune, aplástica) (falta de glóbulos vermelhos no sangue por falta de produção na medula óssea, por destruição ou funcionamento inadequado das hemácias existentes).

**Muito raro:** Meta-hemoglobinemia (hemoglobina defeituosa), agranulocitose, pancitopenia (redução de todas as células do sangue).

##### **Distúrbios cardíacos**

**Muito raro:** Miocardite (inflamação do músculo do coração) alérgica.

**Distúrbios congênitos (característica adquirida pelo bebê durante o período em que permaneceu em gestação) e gravidez, puerpério (fase pós-parto), e condições perinatais (período entre as 22 semanas de gravidez e os 7 dias completos após o nascimento)**

**Desconhecido:** Aborto espontâneo

##### **Distúrbios do ouvido e labirinto**

**Muito raro:** Zumbido, vertigem.

##### **Distúrbios oculares**

**Muito raro:** Uveíte (inflamação de uma das camadas do olho).

**Desconhecido:** Vasculite retiniana.

##### **Distúrbios gastrointestinais**

**Comum:** Náuseas, vômito.



## Bula PACIENTE

**Incomum:** Diarreia, enterocolite pseudomembranosa (um tipo de inflamação intestinal, geralmente provocada pela multiplicação exagerada de alguns tipos de bactéria).

**Raro:** Glossite (inflamação na língua), estomatite (inflamação na mucosa da boca).

**Desconhecido:** Pancreatite aguda.

### **Distúrbios hepatobiliares**

**Comum:** Transaminases elevadas.

**Incomum:** Bilirrubina elevada, hepatite.

**Raro:** Colestase (redução de eliminação da bile).

**Muito raro:** Necrose hepática.

**Desconhecido:** Síndrome do desaparecimento do ducto biliar.

### **Distúrbios do sistema imunológico**

**Muito raro:** Reações alérgicas/ hipersensibilidade (reações tipo alérgicas), como febre, angioedema, reações anafilactoides (reações que lembram anafilaxia, porém com mecanismo diferente; podem cursar com inchaços, reações cutâneas, coceira, dificuldade para respirar e dores abdominais), doença do soro (reação mais tardia, com febre, coceira, dores nas articulações e, eventualmente, lesões renais).

### **Infecções e infestações.**

**Incomum:** Infecções fúngicas, como candidíase (às vezes chamada de “sapinho”).

### **Investigações**

**Desconhecido:** Hipercalcemia (elevação do potássio no sangue), hiponatremia (redução do sódio no sangue).

### **Distúrbios de nutrição e metabolismo**

**Raro:** Hipoglicemia (redução da glicose no sangue).

### **Distúrbios do tecido conectivo e musculoesquelético**

**Muito raro:** Rabdomiólise (necrose das células dos músculos).

**Desconhecido:** Artralgia (dores nas articulações), mialgia (dores musculares).

### **Distúrbios do sistema nervoso**

**Incomum:** Convulsões (ataques em que a pessoa se debate).

**Raro:** Neuropatia (afecção dos nervos) (incluindo neurite periférica – inflamação dos pequenos ramos nervosos das extremidades), parestesia (sensibilidade alterada de uma região do corpo, geralmente com formigamento ou dormência)

**Muito raro:** Ataxia (falta de coordenação de movimento), meningite asséptica (inflamação das meninges, revestimento do cérebro, não provocada por germes) / sintomas como de meningite.

**Desconhecido:** Vasculite cerebral.

### **Transtornos psiquiátricos**

**Raro:** Alucinações.

### **Distúrbios renais e urinários**

**Comum:** Ureia elevada, creatinina sérica elevada.

**Incomum:** Insuficiência renal.

**Raro:** Cristalúria (concentração aumentada de cristais na urina).

**Muito raro:** Nefrite intersticial (inflamação dos rins), aumento da diurese (quantidade de urina).

### **Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino**

**Muito raro:** Infiltrações pulmonares (alterações nos pulmões identificadas em radiografias).

**Desconhecido:** Vasculite pulmonar.

### **Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo**

**Comum:** Erupção medicamentosa fixa, dermatite esfoliativa, erupção cutânea, exantema maculopapular, exantema morbiliforme, eritema, prurido.

**Incomum:** Urticária.

**Muito raro:** Eritema multiforme, fotossensibilidade, síndrome de *Stevens Johnson*, necrólise epidérmica tóxica, erupção cutânea com eosinofilia e sintomas sistêmicos, pustulose exantemática generalizada aguda (edema e vermelhidão na pele com erupções purulentas e febre).

### **Distúrbios vasculares**

**Muito raro:** Púrpura (lesões hemorrágicas, que aparecem na pele e, eventualmente, em outros órgãos, decorrentes de falta de plaquetas), púrpura de *Henoch-Schönlein*.

**Desconhecido:** Vasculite, vasculite necrotizante, granulomatose com poliangéite poliarterite nodosa.



## Bula PACIENTE

### Descrição de eventos adversos selecionados

A maioria das alterações hematológicas observadas tem sido leve, assintomática e reversível na retirada da terapia. Como com qualquer medicamento, reações alérgicas podem ocorrer em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do medicamento. As reações de pele mais comuns observadas com **Bactropin**<sup>®</sup> foram geralmente leves e rapidamente reversíveis após a retirada da medicação.

Infiltrações pulmonares relatadas no contexto da alveolite alérgica ou eosinofílica podem se manifestar através de sintomas como tosse ou falta de ar (vide item *Advertências e Precauções*).

Altas doses de TMP, como usado em pacientes com pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, induzem a um progressivo, mas reversível aumento de concentração sérica de potássio em um número substancial de pacientes. Mesmo em doses recomendadas, TMP podem causar hipercalemia quando administradas a pacientes com doenças subjacentes de metabolismo do potássio ou insuficiência renal, ou que estão recebendo medicamentos que induzem hipercalemia (vide item *Advertências e Precauções*).

Foram notificados casos de hipoglicemia em pacientes não diabéticos tratados com SMZ-TMP, geralmente após alguns dias de terapia (vide item *Interações Medicamentosas*). Pacientes com deficiência de função renal, doença hepática ou desnutrição ou recebendo altas doses de TMP-SMZ estão particularmente em risco.

Vários dos pacientes com pancreatite aguda tinham doenças graves, que incluem a AIDS (síndrome de imunodeficiência adquirida).

### Segurança de sulfametoxazol + trimetoprima em pacientes infectados pelo HIV

Os pacientes portadores de HIV têm o espectro de possíveis eventos adversos similar ao espectro dos pacientes não infectados. Entretanto, alguns eventos adversos podem ocorrer com frequência maior e com quadros clínicos diferenciados nessa população.

Essas diferenças relacionam-se aos seguintes sistemas:

#### **CLASSE DE SISTEMA ORGÂNICO:**

##### **Distúrbios do sangue e sistema linfático**

**Muito comum:** Leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia.

##### **Distúrbios gastrointestinais**

**Muito comum:** Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia.

##### **Distúrbios gerais e condições do local de administração**

**Muito comum:** Febre (geralmente em conjunto com exantema maculopapular).

##### **Distúrbios hepatobiliares**

**Muito comum:** Transaminases elevadas.

##### **Investigações**

**Muito comum:** Hipercalemia.

**Incomum:** Hiponatremia.

##### **Distúrbios de nutrição e metabolismo**

**Incomum:** Hipoglicemia.

##### **Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo**

**Muito comum:** Exantema maculopapular, prurido.

Em ordem de frequência, foram encontrados efeitos gastrintestinais (náuseas, lesões na boca, diarreia), reações de pele e zumbidos nos ouvidos, que desapareceram com a suspensão do tratamento. Alterações no exame de sangue também podem surgir de forma leve e sem sintomas, desaparecendo com a suspensão do tratamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Em caso de ingestão aguda (rápida e intensa) de doses excessivas, intencional ou acidentalmente, podem ocorrer os seguintes sintomas: náuseas, vômito, diarreia, cefaleia, vertigens, tontura e distúrbios mentais e visuais. Nesses casos, deve-se provocar o vômito o mais rapidamente, para eliminar a maior quantidade possível do medicamento ingerido.



## Bula PACIENTE

Em caso de superdose crônica (ingestão de quantidade maior que a indicada, por longo período), podem ocorrer alterações no sangue.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### III- DIZERES LEGAIS

Reg. MS 1.4381.0006

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG 10.883

#### **Fabricado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Av. Coronel Armando Rubens Storino, 2750

Pouso Alegre/MG CEP: 37558-608

CNPJ: 02.814.497/0002-98

#### **Registrado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 121 - São Paulo/SP

CEP: 01550-000 - CNPJ: 02.814.497/0001-07

#### **Comercializado por:**

**1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 119 – CEP: 01550-000

São Paulo/SP – CNPJ 48.113.906/0001-49

Indústria Brasileira

®Marca Registrada

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

0800 704 46 47 [www.grupocimed.com.br](http://www.grupocimed.com.br)

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**







Bula  
PACIENTE

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/10/2014	0907060/14-5	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	10/10/2014	0907060/14-5	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	10/10/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>. Para quê este medicamento é indicado?</li><li>. Como este medicamento funciona?</li><li>. Quando não devo usar este medicamento?</li><li>. O que devo saber antes de usar este medicamento?</li><li>. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?</li><li>. Como devo usar este medicamento?</li><li>. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?</li><li>. Quais os males que este medicamento pode me causar?</li><li>. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?</li><li>. Indicações</li><li>. Resultados de eficácia</li><li>. Características farmacológicas</li><li>. Contra – indicações</li><li>. Advertências e precauções</li><li>. Interações medicamentosas</li><li>. Cuidados de armazenamento do medicamento</li></ul>	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20

## Bula PACIENTE

							. Posologia e modo de usar . Reações adversas . Superdose		
09/03/2015	0207809/15-1	10756 – SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula para adequação a intercambialidade	09/03/2015	0207809/15-1	10756 – SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula para adequação a intercambialida de	09/03/2015	. Apresentação . Composição	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
03/02/17	0188904/17-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/17	0188904/17-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/17	1. Para que este medicamento é indicado? 3. Quando não devo usar este medicamento? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento? 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
16/02/2017	0263294/17-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/02/2017	0263294/17-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/02/2017	* IDENTIFICAÇÃO * INFORMAÇÕES AO PACIENTE * 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
06/03/2017	0354729/17-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/03/2017	0354729/17-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/03/2017	DIZERES LEGAIS	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20

## Bula PACIENTE

07/02/2018	0102213/18-0	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/02/2018	0102213/18-0	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/02/2018	1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?  DIZERES LEGAIS	VP	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
18/02/2019	0152079/19-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	18/02/2019	0152079/19-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	18/02/2019	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? DIZERES LEGAIS	VP	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
11/04/2019	0328552/19-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/04/2019	0328552/19-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/04/2019	9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
11/07/2019	0607124/19-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2019	0607124/19-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2019	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
-	-	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula –	-	-	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20

# CIMED

Bula

**PACIENTE**

		RDC 60/12			Texto de Bula – RDC 60/12		DIZERES LEGAIS		
--	--	-----------	--	--	------------------------------	--	----------------	--	--



Bula  
PACIENTE

**BACTROPIN<sup>®</sup>**  
**sulfametoxazol + trimetoprima**

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

SUSPENSÃO ORAL

200 MG/5 ML + 40 MG/5 ML



## Bula PACIENTE

### I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

#### **Bactropin®**

sulfametoxazol 200 mg/5 mL + trimetoprima 40 mg/5 mL

#### **MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO REFERÊNCIA**

**Agente quimioterápico com duplo mecanismo de ação e propriedades bactericidas.  
Antibacteriano para uso sistêmico.**

#### **APRESENTAÇÃO**

Suspensão oral: frasco com 100 mL

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 SEMANAS DE VIDA**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada 5 mL contém:

sulfametoxazol..... 200 mg

trimetoprima..... 40 mg

Excipientes\*q.s.p.:..... 5 mL

\*sacarose, álcool etílico, aromas de banana e morango, corante amarelo de tartrazina e vermelho *ponceau*, glicerol, metilparabeno, celulose microcristalina, propilparabeno e água purificada.

### II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações a seguir. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Bactropin®** é indicado para o tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis à associação dos medicamentos trimetoprima e sulfametoxazol, como certas infecções respiratórias, gastrintestinais, renais e do trato urinário, genitais (feminino e masculino), da pele, entre outros tipos de infecções.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**Bactropin®** é um quimioterápico (medicamento sintetizado em laboratório para combater microrganismos ou a multiplicação desordenada de células), com propriedades bactericidas (capaz de matar bactérias) e duplo mecanismo de ação.

**Bactropin®** contém dois compostos ativos (sulfametoxazol + trimetoprima), que agem sinergicamente (ação conjunta, em que uma substância potencializa a outra), inibindo dois passos consecutivos da formação de uma substância necessária aos microrganismos, que não conseguem mais se desenvolver.

A ação medicamentosa de **Bactropin®** começa logo após a primeira dose. No entanto, os microrganismos não são eliminados de imediato. Por isso, mesmo que alguns sintomas, como febre, dor, etc. desapareçam, é necessário continuar o tratamento pelo período estabelecido pelo seu médico.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Bactropin®** não deve ser utilizado por pacientes com doença grave no fígado ou no rim. Também está contraindicado aos pacientes com alergia à sulfonamida ou à trimetoprima ou a qualquer um dos componentes da formulação.

**Bactropin®** não deve ser utilizado em combinação com dofetilida (medicamento contra arritmias do coração) (vide item *O que devo saber antes de usar este medicamento? – Interações medicamentosas*).

**Este medicamento é contraindicado para prematuros e recém-nascidos durante as primeiras seis semanas de vida.**

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre**



## Bula PACIENTE

as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve-se ter cuidados especiais com pacientes idosos e com problemas no rim e no fígado, nos quais há maior probabilidade de ocorrer efeitos indesejáveis relacionados à dose ou à duração do tratamento. Em pacientes idosos ou com história de deficiência de ácido fólico ou insuficiência renal, podem ocorrer alterações hematológicas (no sangue) indicativas de deficiência de ácido fólico. Essas alterações são reversíveis administrando-se ácido fólico.

Para diminuir esses efeitos, recomenda-se que a duração do tratamento seja a menor possível para o paciente idoso. Em caso de comprometimento renal, a dose deve ser ajustada. Pacientes em uso prolongado devem fazer exames de sangue e urina regularmente.

O tratamento deve ser descontinuado imediatamente caso você observe sinais de aparecimento de erupção cutânea ou qualquer outra reação adversa grave.

**Bactropin®** deve ser administrado com cautela a pacientes com história de alergia grave e asma brônquica.

Infiltrados pulmonares (alterações nos pulmões identificadas em radiografias), tais como ocorrem em alveolite (inflamação dos alvéolos, pequenos sacos aéreos que se enchem de ar durante a respiração) alérgica ou eosinofílica (por um tipo de glóbulo branco), têm sido relatados. Esses podem se manifestar por meio de sintomas como tosse ou respiração ofegante. Se tais sintomas aparecerem ou, inexplicavelmente, piorarem, o paciente deve ser reavaliado e a descontinuação da terapia com **Bactropin®** deve ser considerada.

**Bactropin®** não deve ser utilizado por pacientes com sérias alterações hematológicas (no sangue) nem por pacientes portadores de deficiência de G6PD (desidrogenase de glicose-6-fosfato), a não ser em casos de absoluta necessidade e em doses mínimas.

Como todos os medicamentos que contêm sulfonamidas (como o sulfametoxazol), deve-se ter cautela com pacientes com porfiria (doença que apresenta irregularidade no metabolismo da hemoglobina, pigmento responsável pela cor vermelha do sangue) ou disfunção da tireoide.

**Bactropin®** pode aumentar a excreção urinária, particularmente em pacientes com edema (retenção de líquidos) de origem cardíaca.

Pacientes com insuficiência renal grave (ou seja, com depuração da creatinina 15-30 mL/min) que estão recebendo sulfametoxazol-trimetoprima devem ser monitorados quanto aos sinais e sintomas de toxicidade, tais como náuseas, vômitos e hipercalemia (elevação do potássio no sangue).

Altas doses de TMP, como as usadas em pacientes com pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, induzem progressivo, mas reversível, aumento da concentração de potássio sérico em um número substancial de pacientes. Mesmo doses recomendadas de TMP podem causar hipercalemia, quando administradas em pacientes com doenças subjacentes do metabolismo do potássio, insuficiência renal ou que estejam recebendo drogas que provocam hipercalemia. É indicado monitoramento rigoroso do potássio sérico nesses pacientes.

#### Gravidez e lactação:

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Você deve informar ao seu médico caso ocorra gravidez durante o tratamento ou logo após o seu término.

Dois estudos sugeriram um aumento de 2 a 3,5 vezes do risco de aborto espontâneo em mulheres tratadas apenas com trimetoprima e em combinação com sulfametoxazol durante o primeiro trimestre em comparação com nenhuma exposição a antibióticos ou exposição a penicilinas.

Uma vez que os dois compostos de **Bactropin®** atravessam a barreira placentária, eles podem vir a interferir no metabolismo humano do ácido fólico, devendo ser usado na gestação somente se o risco para o feto for justificado pelo benefício para a gestante. Caso haja necessidade de uso, toda gestante ou mulheres que pretendem engravidar devem receber concomitantemente 5 mg de ácido fólico diariamente durante o tratamento com **Bactropin®**. Deve-se evitar o uso de **Bactropin®** no último trimestre de gestação, a não ser que não exista nenhuma alternativa, devido ao risco do recém-nascido apresentar problemas neurológicos devido ao acúmulo de bilirrubina no cérebro (*kernicterus*).

Os dois compostos de **Bactropin®** são excretados pelo leite, devendo-se levar em consideração os riscos já citados acima. Informe ao seu médico se está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação, exceto sob orientação médica.

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**



## Bula PACIENTE

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

Até o momento, não há informações de que **Bactropin®** (sulfametoxazol e trimetoprima) possa causar *doping*.

Em caso de dúvida, consulte seu médico.

### **Interações medicamentosas**

Devido à possibilidade de interação medicamentosa, você deve ter cautela com o uso concomitante de **Bactropin®** e os medicamentos ou substâncias descritos a seguir:

– diuréticos (medicamentos que aumentam a quantidade de urina eliminada) e digoxina (medicamento para o coração);  
– medicamentos para doenças do sistema nervoso: depressores do sistema nervoso central, como, por exemplo, antidepressivos e fenitoína;

– medicamentos que contenham em sua fórmula: amantadina (medicamento antiviral e antiparkinsoniano), lamivudina (antirretroviral utilizado em pacientes portadores de HIV), ou memantina (utilizado em doença de *Alzheimer*), antidiabéticos orais, ciclosporina (usada em transplante, por exemplo), indometacina (usada em doenças reumatológicas, por exemplo) metotrexato (usado em doenças reumatológicas, por exemplo), pirimetamina (usada em infecções, como toxoplasmose, por exemplo) e varfarina (anticoagulante).

Há evidências de que a trimetoprima interage com a dofetilida, portanto, **Bactropin®** não deve ser administrado em combinação com esse fármaco.

A exposição sistêmica a medicamentos metabolizados pelas enzimas do fígado (citocromo P450 2C8) pode aumentar quando administrado com trimetoprima (TMP) e sulfametoxazol (SMZ). Exemplos incluem paclitaxel (oncológico), amiodarona (usado em arritmias cardíacas), dapsona (usado em doenças de pele), repaglinida, rosiglitazona e pioglitazona (usados em diabetes).

### **Interações farmacodinâmicas e interações de mecanismo indefinido**

A taxa de incidência e gravidade das reações adversas mielotóxicas e nefrotóxicas pode aumentar quando TMP-SMZ é administrado concomitantemente com outros medicamentos mielossupressores ou associados à disfunção renal, como análogos de nucleosídeos, tacrolimus, azatioprina ou mercaptopurina. Pacientes que recebem TMP-SMZ concomitantemente com tais medicamentos devem ser monitorados quanto à toxicidade hematológica e/ou renal.

A administração em conjunto com a clozapina (usado em esquizofrenia), uma substância conhecida por ter um grande potencial para causar agranulocitose (diminuição dos glóbulos brancos), deve ser evitada. Devido aos efeitos poupadores de potássio de TMP e SMZ, cuidado deve ser tomado quando TMP e SMZ são administrados com outros agentes que aumentam o potássio sérico, tais como inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina, diuréticos poupadores de potássio, e prednisolona.

### **Interferência em exames de laboratório**

**Bactropin®**, especialmente o componente TMP, pode interferir na dosagem do metotrexato sérico, dependendo da técnica utilizada para medição do fármaco.

A presença de TMP e SMZ pode também interferir na dosagem de creatinina, ocasionando aumento de cerca de 10% nos valores da faixa de normalidade.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Bactropin®** suspensão oral deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Características do produto:**

Suspensão laranja claro, homogênea viscosa com odor característico de banana.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**





## Bula PACIENTE

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

As suspensões de **Bactropin**<sup>®</sup> devem ser administradas por via oral, pela manhã e à noite, de preferência após uma refeição, e com quantidade suficiente de líquido.

**O frasco de suspensão deve ser agitado antes da administração.**

A posologia deve ser orientada pelo seu médico, de acordo com a sua doença. No entanto, as doses usualmente recomendadas para as suspensões de **Bactropin**<sup>®</sup> são:

**Crianças abaixo de 12 anos:**

de 6 semanas a 5 meses: 2,5 mL da suspensão a cada 12 horas.

de 6 meses a 5 anos: 5 mL da suspensão a cada 12 horas.

de 6 a 12 anos: 10 mL da suspensão a cada 12 horas.

A posologia acima indicada corresponde, aproximadamente, a dose diária média de 6 mg de trimetoprima e 30 mg de sulfametoxazol por kg de peso. Em infecções graves a dosagem recomendada pode ser aumentada em 50%.

**Adultos e crianças a partir de 12 anos:**

Dose habitual: 20 mL da suspensão a cada 12 horas.

Dose mínima e dose para tratamento prolongado (mais de 14 dias): 10 mL da suspensão a cada 12 horas.

Dose máxima (casos especialmente graves): 30 mL da suspensão a cada 12 horas.

### Duração do tratamento

Em infecções agudas, **Bactropin**<sup>®</sup> deve ser administrado por, pelo menos, cinco dias ou até que o paciente esteja sem presença de sintomas por, pelo menos, dois dias. Se a melhora clínica não for evidente após sete dias de tratamento, o paciente deve ser reavaliado.

Esquemas de tratamento especiais são recomendados em determinadas doenças e condições clínicas dos pacientes. O seu médico saberá identificar essas situações e adotar o esquema de doses adequado.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar alguma das doses prescritas, espere até o horário da dose seguinte e retorne ao seu esquema de tratamento habitual. Não tome uma dose dobrada para compensar a que você esqueceu.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Nas doses recomendadas, **Bactropin**<sup>®</sup> é geralmente bem tolerado. Os efeitos colaterais mais comuns são erupções cutâneas e distúrbios gastrintestinais.

Entretanto, efeitos colaterais adicionais já foram descritos em frequência variável nos pacientes expostos à medicação. As categorias utilizadas como padrões de frequência (número de eventos relatados / número de pacientes expostos à medicação) são as seguintes:

Muito comum  $\geq 1/10$ ; comum  $\geq 1/100$  e  $< 1/10$ ; incomum  $\geq 1/1.000$  e  $< 1/100$ ; raro  $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ ; e muito raro  $< 1/10.000$ . Desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

**Efeitos adversos relatados em pacientes tratados com trimetoprima + sulfametoxazol:**

#### CLASSE DE SISTEMA ORGÂNICO

#### Distúrbios do sangue e sistema linfático

**Raro:** Leucopenia (redução dos glóbulos brancos do sangue), granulocitopenia, trombocitopenia, anemia (megaloblástica, hemolítica / autoimune, aplástica) (falta de glóbulos vermelhos no sangue por falta de produção na medula óssea, por destruição ou funcionamento inadequado das hemácias existentes).

**Muito raro:** Meta-hemoglobinemia (hemoglobina defeituosa), agranulocitose, pancitopenia (redução de todas as células do sangue).

#### Distúrbios cardíacos

**Muito raro:** Miocardite (inflamação do músculo do coração) alérgica.



## Bula PACIENTE

**Distúrbios congênitos (característica adquirida pelo bebê durante o período em que permaneceu em gestação) e gravidez, puerpério (fase pós-parto), e condições perinatais (período entre as 22 semanas de gravidez e os 7 dias completos após o nascimento)**

**Desconhecido:** Aborto espontâneo.

**Distúrbios do ouvido e labirinto**

**Muito raro:** Zumbido, vertigem.

**Distúrbios oculares**

**Muito raro:** Uveíte (inflamação de uma das camadas do olho).

**Desconhecido:** Vasculite retiniana.

**Distúrbios gastrintestinais**

**Comum:** Náuseas, vômito.

**Incomum:** Diarreia, enterocolite pseudomembranosa (um tipo de inflamação intestinal, geralmente provocada pela multiplicação exagerada de alguns tipos de bactéria).

**Raro:** Glossite (inflamação na língua), estomatite (inflamação na mucosa da boca).

**Desconhecido:** Pancreatite aguda.

**Distúrbios hepatobiliares**

**Comum:** Transaminases elevadas.

**Incomum:** Bilirrubina elevada, hepatite.

**Raro:** Colestase (redução de eliminação da bile).

**Muito raro:** Necrose hepática.

**Desconhecido:** Síndrome do desaparecimento do ducto biliar.

**Distúrbios do sistema imunológico**

**Muito raro:** Reações alérgicas/hipersensibilidade (reações tipo alérgicas), como febre, angioedema, reações anafilactoides (reações que lembram anafilaxia, porém com mecanismo diferente; podem cursar com inchaços, reações cutâneas, coceira, dificuldade para respirar e dores abdominais), doença do soro (reação mais tardia, com febre, coceira, dores nas articulações e, eventualmente, lesões renais).

**Infecções e infestações.**

**Incomum:** Infecções fúngicas, como candidíase (às vezes chamada de “sapinho”).

**Investigações**

**Desconhecido:** Hipercalemia (elevação do potássio no sangue), hiponatremia (redução do sódio no sangue).

**Distúrbios de nutrição e metabolismo**

**Raro:** Hipoglicemia (redução da glicose no sangue).

**Distúrbios do tecido conectivo e musculoesquelético**

**Muito raro:** Rabdomiólise (necrose das células dos músculos).

**Desconhecido:** Artralgia (dores nas articulações), mialgia (dores musculares).

**Distúrbios do sistema nervoso**

**Incomum:** Convulsões (ataques em que a pessoa se debate).

**Raro:** Neuropatia (afecção dos nervos) (incluindo neurite periférica – inflamação dos pequenos ramos nervosos das extremidades), parestesia (sensibilidade alterada de uma região do corpo, geralmente com formigamento ou dormência)

**Muito raro:** Ataxia (falta de coordenação de movimento), meningite asséptica (inflamação das meninges, revestimento do cérebro, não provocada por germes) / sintomas como de meningite.

**Desconhecido:** Vasculite cerebral.

**Transtornos psiquiátricos**

**Raro:** Alucinações.

**Distúrbios renais e urinários**

**Comum:** Ureia elevada, creatinina sérica elevada.

**Incomum:** Insuficiência renal.

**Raro:** Cristalúria (concentração aumentada de cristais na urina).

**Muito raro:** Nefrite intersticial (inflamação dos rins), aumento da diurese (quantidade de urina).

**Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino**

**Muito raro:** Infiltrações pulmonares (alterações nos pulmões identificadas em radiografias).

**Desconhecido:** Vasculite pulmonar.

**Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo**



## Bula PACIENTE

**Comum:** Erupção medicamentosa fixa, dermatite esfoliativa, erupção cutânea, exantema maculopapular, exantema morbiliforme, eritema, prurido.

**Incomum:** Urticária.

**Muito raro:** Eritema multiforme, fotossensibilidade, síndrome de *Stevens Johnson*, necrólise epidérmica tóxica, erupção cutânea com eosinofilia e sintomas sistêmicos, pustulose exantemática generalizada aguda (edema e vermelhidão na pele com erupções purulentas e febre).

### **Distúrbios vasculares**

**Muito raro:** Púrpura (lesões hemorrágicas, que aparecem na pele e, eventualmente, em outros órgãos, decorrentes de falta de plaquetas), púrpura de *Henoch-Schönlein*.

**Desconhecido:** Vasculite, vasculite necrotizante, granulomatose com poliangite poliarterite nodosa.

### **Descrição de eventos adversos selecionados**

A maioria das alterações hematológicas observadas tem sido leve, assintomática e reversível na retirada da terapia. Como qualquer medicamento, reações alérgicas podem ocorrer em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do medicamento. As reações de pele mais comuns observadas com **Bactropin**<sup>®</sup> foram geralmente leves e rapidamente reversíveis após a retirada da medicação.

Infiltrações pulmonares relatadas no contexto da alveolite alérgica ou eosinofílica podem se manifestar através de sintomas como tosse ou falta de ar (vide item *Advertências e Precauções*).

Altas doses de TMP, como usado em pacientes com pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, induzem a progressivo, mas reversível aumento de concentração sérica de potássio em um número substancial de pacientes. Mesmo em doses recomendadas, TMP pode causar hipercalemia quando administrada em pacientes com doenças subjacentes de metabolismo do potássio ou insuficiência renal, ou que estão recebendo medicamentos que induzem hipercalemia (vide item *Advertências e Precauções*).

Foram notificados casos de hipoglicemia em pacientes não diabéticos tratados com SMZ-TMP, geralmente após alguns dias de terapia (vide item *Interações Medicamentosas*). Pacientes com deficiência de função renal, doença hepática ou desnutrição ou recebendo altas doses de TMP-SMZ estão particularmente em risco.

Vários dos pacientes com pancreatite aguda tinham doenças graves, quem incluem a AIDS (síndrome de imunodeficiência adquirida).

### **Segurança de sulfametoxazol + trimetoprima em pacientes infectados pelo HIV**

Os pacientes portadores de HIV têm o espectro de possíveis eventos adversos similar ao espectro dos pacientes não infectados. Entretanto, alguns eventos adversos podem ocorrer com frequência maior e com quadros clínicos diferenciados nessa população. **CLASSE DE SISTEMA ORGÂNICO**

Essas diferenças relacionam-se aos seguintes sistemas:

#### **Distúrbios do sangue e sistema linfático**

**Muito comum:** Leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia.

#### **Distúrbios gastrointestinais**

**Muito comum:** Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia.

#### **Distúrbios gerais e condições do local de administração**

**Muito comum:** Febre (geralmente em conjunto com exantema maculopapular).

#### **Distúrbios hepatobiliares**

**Muito comum:** Transaminases elevadas.

#### **Investigações**

**Muito comum:** Hipercalemia.

**Incomum:** Hiponatremia.

#### **Distúrbios de nutrição e metabolismo**

**Incomum:** Hipoglicemia.

#### **Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo**

**Muito comum:** Exantema maculopapular, prurido.



## Bula PACIENTE

Em ordem de frequência, foram encontrados efeitos gastrintestinais (náuseas, lesões na boca, diarreia), reações de pele e zumbidos nos ouvidos, que desapareceram com a suspensão do tratamento. Alterações no exame de sangue também podem surgir de forma leve e sem sintomas, desaparecendo com a suspensão do tratamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Em caso de ingestão aguda (rápida e intensa) de doses excessivas, intencional ou acidentalmente, podem ocorrer os seguintes sintomas: náuseas, vômito, diarreia, cefaleia, vertigens, tontura e distúrbios mentais e visuais. Nessa situação, deve-se provocar vômito rapidamente, para eliminar a maior quantidade possível do medicamento ingerido.

Em caso de superdose crônica (ingestão de quantidade maior que a indicada, por longo período), podem ocorrer alterações no sangue.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III- DIZERES LEGAIS**

Reg. MS 1.4381.0006

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG 10.883

#### **Fabricado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Av. Coronel Armando Rubens Storino, 2750

Pouso Alegre/MG - CEP: 37558-608

CNPJ: 02.814.497/0002-98

#### **Registrado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 121 - São Paulo/SP

CEP: 01550-000 - CNPJ: 02.814.497/0001-07

#### **Comercializado por:**

**IFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 119 - CEP: 01550-000

São Paulo/SP - CNPJ 48.113.906/0001-49

Indústria Brasileira

®Marca Registrada

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

0800 704 46 47 [www.grupocimed.com.br](http://www.grupocimed.com.br)

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**





Bula  
PACIENTE

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/10/2014	0907060/14-5	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	10/10/2014	0907060/14-5	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	10/10/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>. Para quê este medicamento é indicado?</li><li>. Como este medicamento funciona?</li><li>. Quando não devo usar este medicamento?</li><li>. O que devo saber antes de usar este medicamento?</li><li>. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?</li><li>. Como devo usar este medicamento?</li><li>. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?</li><li>. Quais os males que este medicamento pode me causar?</li><li>. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?</li><li>. Indicações</li><li>. Resultados de eficácia</li><li>. Características farmacológicas</li><li>. Contra – indicações</li><li>. Advertências e precauções</li><li>. Interações medicamentosas</li><li>. Cuidados de armazenamento do medicamento</li></ul>	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20



Bula  
PACIENTE

							. Posologia e modo de usar . Reações adversas . Superdose		
09/03/2015	0207809/15-1	10756 – SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula para adequação a intercambialidade	09/03/2015	0207809/15-1	10756 – SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula para adequação a intercambialidade	09/03/2015	. Apresentação . Composição	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
03/02/17	0188904/17-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/17	0188904/17-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/17	3. Quando não devo usar este medicamento? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP/VPS	400 MG + 80 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
06/03/2017	0354729/17-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/03/2017	0354729/17-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/03/2017	* IDENTIFICAÇÃO * INFORMAÇÕES AO PACIENTE * 4 O que devo saber antes de usar este medicamento? * 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? DIZERES LEGAIS	VP/VPS	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML
07/02/2018	0102213/18-0	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/02/2018	0102213/18-0	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/02/2018	6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?  DIZERES LEGAIS	VP	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML
18/02/2019	0152079/19-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula –	18/02/2019	0152079/19-2	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de	18/02/2019	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME	VP	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML

# CIMED

## Bula PACIENTE

		RDC 60/12			Texto de Bula – RDC 60/12		CAUSAR? DIZERES LEGAIS		
11/04/2019	0328552/19-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/04/2019	0328552/19-9	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/04/2019	9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML
11/07/2019	0607124/19-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2019	0607124/19-4	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2019	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML
-	-	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	10450 SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	DIZERES LEGAIS	VP	40 MG/ ML + 8 MG /ML FR C/ 100 ML