



**VITAXON C**  
Airela Indústria Farmacêutica Ltda  
Comprimido efervescente  
1G/comp. eferv.

**VITAXON® C**

ácido ascórbico

**APRESENTAÇÕES**

Forma farmacêutica: comprimido efervescente

Concentração: 1 g de ácido ascórbico / comprimido efervescente

Apresentações: Cartucho contendo tubo com 10, 20 ou 30 comprimidos efervescentes - sabor laranja

Cartucho contendo tubo com 10 comprimidos efervescentes - sabor acerola

**USO ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

**SABOR LARANJA**

Cada comprimido efervescente contém:

ácido ascórbico (vitamina C)..... 1 g

Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido efervescente

(Excipientes: ácido cítrico, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio anidro, ciclamato de sódio, sacarina sódica, corante laca amarelo nº 6, corante amarelo crepúsculo, sorbitol, macrogol, benzoato de sódio e aroma sólido idêntico ao natural de laranja).

**SABOR ACEROLA**

Cada comprimido efervescente contém:

ácido ascórbico (vitamina C)..... 1 g

Excipientes q.s.p. .... 1 comprimido efervescente

(Excipientes: ácido adipínico, ácido cítrico, corante amarelo crepúsculo, aroma de acerola, bicarbonato de sódio, óleo de silicone, corante vermelho Bordeaux e sacarose).

Componente do VITAXON® C	% Ingestão Diária Recomendada (IDR) – Resolução RDC Nº 269/2005				
	Adultos	Gestantes	Lactantes	Crianças	
				1 – 6 anos	7 – 10 anos
ácido ascórbico (vitamina C)	2.222,2%	1.818,18%	1.428,57%	3.333,3%	2.857,14%
Posologia diária	1 comprimido efervescente				

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico.

## **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O ácido ascórbico (vitamina C), componente ativo de VITAXON® C, atua no sistema imunológico, melhorando a resposta das células de defesa, principalmente, por seu papel regulador da atuação de leucócitos. A suplementação com vitamina C pode trazer benefício clínico para pessoas que apresentam carência desta vitamina, a qual pode ser decorrente de baixa ingestão, e para àquelas que apresentam a necessidade aumentada desta vitamina.

## **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento VITAXON® C não deve ser utilizado nos casos de litíase urinária oxálica e úrica (cálculos renais ou pedras nos rins) e insuficiência renal (deficiência no funcionamento dos rins). Também não deve ser utilizado por pessoas que apresentem alergia aos componentes da formulação.

**Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes portadores de cálculos renais ou pedras nos rins e insuficiência renal.**

**Este medicamento é contraindicado para menores de 1 ano.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**VITAXON C sabor laranja: não contém açúcar.**

**VITAXON C sabor acerola: Atenção diabéticos: este medicamento contém açúcar.**

## **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Pacientes diabéticos, hipoglicêmicos (baixos níveis de glicose no sangue), hipertensos e cardíacos devem procurar orientação médica antes de utilizarem VITAXON® C devido ao seu conteúdo de carboidratos (açúcares) e sódio.

Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

Não existem advertências ou restrições específicas do uso do produto para pacientes idosos.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**VITAXON C sabor laranja: não contém açúcar.**

**VITAXON C sabor acerola: Atenção diabéticos: este medicamento contém açúcar.**

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Este produto não deve ser utilizado concomitantemente com barbitúricos (fenobarbital, hexobarbital), já que pode ocorrer um aumento da necessidade diária do ácido ascórbico.

O uso simultâneo de vitamina C e deferoxamina pode levar a um aumento dos efeitos tóxicos ocasionados pelo ferro.

A utilização concomitante de vitamina C e salicilatos (ácido acetilsalicílico) pode aumentar a excreção desta vitamina pela urina.

A vitamina C pode interferir com o resultado de alguns exames laboratoriais, como determinação de glicemia, glicosúria, níveis séricos de transaminases, desidrogenase láctica e bilirrubina. Além disso, podem ocorrer resultados falso negativos em pesquisa de sangue oculto nas fezes. Antes de realizar estes exames, é necessário interromper o uso do medicamento VITAXON® C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Manter o tubo sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

O medicamento VITAXON® C é apresentado em forma de comprimido efervescente de coloração laranja (sabor laranja) ou comprimido efervescente de coloração rosa (sabor acerola) e odor característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso oral. Utilizar um comprimido efervescente ao dia, dissolvido em água (dose diária de 1 g de ácido ascórbico).

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo provocar danos à saúde.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este comprimido não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações adversas são pouco frequentes e de pequena intensidade, compreendendo problemas digestivos, principalmente diarreia, pirose (sensação de calor ou queimação no estômago), aumento da diurese (aumento do volume urinário), náuseas (enjoo) e vômitos.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

O uso de doses elevadas de vitamina C, por tempo prolongado, pode ocasionar o escorbuto de rebote.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.4493.0031

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters – CRF/SC 4116

**AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rodovia SC 390, km 459, nº 500 – Bairro: Ilhota/Distrito Industrial

Pedras Grandes/SC – CEP: 88720-000

CNPJ: 01.858.973/0001-29

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

SIA: 0800 646 2010

sia@airela.com.br

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



### Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
27/06/2014	0525441/14-8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	27/06/2014	0525441/14-8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	27/06/2014	Dizeres legais	VP/VPS	1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 20 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 30 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR ACEROLA)
19/03/2019	0247551/19-1	10454- ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	19/03/2019	0247551/19-1	10454- ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	Não aplicável	Dizeres legais	VP/VPS	1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 20 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 30 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR ACEROLA)
13/07/2020		10454- ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto	13/07/2020		10454- ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto	Não aplicável	Dizeres Legais	VP/VPS	1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 20 (SABOR LARANJA)



		de Bula – RDC 60/12			de Bula – RDC 60/12				1 G COM EFEV EST TB PLAS X 30 (SABOR LARANJA) 1 G COM EFEV EST TB PLAS X 10 (SABOR ACEROLA)
--	--	------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--