



# **cefalexina**

Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.

cápsulas

500mg

# cefalexina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

## I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### cefalexina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

### APRESENTAÇÕES

**Cefalexina** 500 mg cápsulas possui as apresentações:

Cartucho com 10 cápsulas

Cartucho com 100 cápsulas

Cartucho com 200 cápsulas

### VIA ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de cefalexina contém:

cefalexina monoidratada..... 526 mg \*

\*Equivalente a 500 mg de cefalexina base.

Excipientes qsp.....1 cápsula.

Excipientes: celulose microcristalina, croscarmelose sódica, estearato de magnésio.

## II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Cefalexina é indicada para o tratamento de infecções do trato respiratório, otite média (inflamação no ouvido), infecções na pele e tecidos moles, infecções urinárias e infecções ósseas.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Cefalexina é um antibacteriano da classe das cefalosporinas. Em doses adequadas promove a morte das bactérias. O tempo para cura da infecção pode variar de dias a meses, dependendo do local e do tipo de bactéria causadora da infecção e das condições do paciente.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Cefalexina não deve ser usada por pacientes com histórico de reação alérgica a penicilinas, derivados da penicilina, penicilamina ou a outras cefalosporinas.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes que o tratamento com o cefalexina seja iniciado, informe ao seu médico se você já apresentou reações anteriores de alergia a algum medicamento, especialmente à cefalexina, a outras cefalosporinas, às penicilinas ou à penicilamina. Pacientes alérgicos a penicilinas podem ser alérgicos também a cefalosporinas. Se uma reação alérgica ocorrer, interrompa o tratamento com o medicamento.

O tratamento com o cefalexina, assim como outros antibióticos, pode levar ao crescimento aumentado da bactéria *Clostridium difficile*, a principal causa de colite associada ao uso de antibiótico (caracterizada por dor na barriga e no estômago; cólica, diarreia aquosa, podendo conter sangue; febre). É importante considerar este diagnóstico caso você apresente diarreia durante ou até dois meses após o uso do antibiótico. Informe ao seu médico se você já apresentou alguma doença gastrointestinal, particularmente colite.

Pacientes com a função renal diminuída podem precisar de doses menores que pacientes com a função renal normal.

**ATENÇÃO:** Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.



AUROBINDO

**Uso na gravidez – categoria de risco B.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso na amamentação:** a cefalexina é excretada no leite materno em pequenas quantidades. Portanto, deve ser administrada com cuidado a mulheres que estão amamentando.

**Uso em idosos:** pacientes idosos tem maior probabilidade de apresentar a função dos rins diminuída, portanto podem ser necessários a administração de doses menores e o monitoramento da função dos rins.

#### **Interações medicamentosas**

A probenecida pode aumentar e prolongar a concentração da cefalexina no sangue.

Os diuréticos de alça (ex.: furosemida) podem aumentar o risco de toxicidade para os rins com as cefalosporinas.

#### **Interações com testes laboratoriais**

A cefalexina pode alterar o resultado de exames que detectam glicose na urina através da solução de Benedict ou Fehling ou dos comprimidos de Clinitest.

Pacientes que receberam cefalexina ou recém-nascidos cujas mães receberam tratamento com esta droga podem apresentar resultado positivo no teste de antígeno globulina (teste de Coombs). Este resultado poderá ser atribuído à droga.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista. Pode ser perigoso para sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Cefalexina deve ser guardada em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15° a 30°C), protegida da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Características físicas e organolépticas:**

Cápsula azul claro / azul escuro, contendo pó branco a quase branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Cefalexina deve ser administrada por via oral, de acordo com as orientações médicas.

**ATENÇÃO:** antes da administração, deve ser verificada a capacidade do paciente de engolir o medicamento na forma de cápsula. A cápsula não deve ser aberta, dividida ou mastigada.

#### **Posologia**

##### **Adultos e adolescentes**

**Cistite não complicada; faringite; infecção da pele e dos tecidos moles; amigdalite:** 500 mg cada 12 horas.

**NOTA:** o tratamento de cistite é indicado apenas para adultos e adolescentes com mais de 15 anos, e deve durar de 7 a 14 dias.



AUROBINDO

### **Prevenção de endocardite bacteriana (infecção das válvulas do coração) em pacientes com alergia a penicilina:**

2 g, em dose única, uma hora antes do início do procedimento.

#### **Outras infecções:**

- leve a moderada: 250 mg\* cada 6 horas.
- grave: até 1 g cada 6 horas.

\*Cefalexina cápsula deve ser administrada somente em doses múltiplas de 500 mg. Para outras doses recomenda-se a administração de cefalexina suspensão oral.

**Dose máxima para adultos:** 4 g por dia.

#### **Crianças**

Cefalexina cápsula não é indicada para pacientes pediátricos. Recomenda-se a administração de cefalexina suspensão oral.

#### **Idosos**

Não é necessário ajuste de dose. Ver **POSOLOGIA- ADULTOS E ADOLESCENTES**.

Pacientes idosos tem maior chance de ter a função dos rins diminuída e podem precisar de doses menores.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de usar este medicamento, entre em contato com seu médico. Deixar de administrar uma ou mais doses ou não completar o tratamento pode comprometer o resultado.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

### **Reações adversas raras**

**Gastrintestinais** - a reação adversa mais comum tem sido a diarreia, sendo raramente grave o bastante para levar a interrupção do tratamento. Também podem ocorrer sintomas de colite pseudomembranosa durante ou após o tratamento com antibiótico (caracterizada por dor na barriga e no estômago; cólica, diarreia aquosa, podendo conter sangue; febre), dispepsia (má digestão), dor abdominal, náuseas, vômitos, hepatite (inflamação do fígado) transitória e icterícia colestática (caracterizada por pele e mucosas amareladas).

**Alergia** - foram observadas reações alérgicas na forma de erupções na pele, urticária, angioedema (caracterizado por inchaço na pele ou mucosas) e eritema multiforme (caracterizado por lesões avermelhadas), Síndrome de Stevens Johnson ou necrólise tóxica epidérmica (reação alérgica grave na pele com bolhas e vermelhidão). Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga. Anafilaxia (reação alérgica aguda, caracterizada por urticária, coceira e angioedema) também foi relatada.

### **Reações adversas muito raras**

Outras reações têm incluído coceira anal e genital, monilíase genital (infecção por fungo), vaginite (inflamação na vagina) e corrimento vaginal, tonturas, fadiga, dor de cabeça, agitação, confusão, alucinações, artralgia (dor nas articulações), artrite (inflamação nas articulações) e doenças nas articulações. Tem sido raramente relatada nefrite intersticial reversível (inflamação no rim). Eosinofilia (aumento de eosinófilos no sangue), neutropenia (diminuição de neutrófilos no sangue), trombocitopenia (diminuição de plaquetas no sangue) e elevações moderadas de enzimas do fígado (AST e ALT) no soro têm sido referidas.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento (SAC).**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Sinais e sintomas**



AUROBINDO

Após uma superdose de cefalexina, o paciente pode apresentar náusea, vômito, dor epigástrica, diarreia e sangue na urina.

**Tratamento**

Procurar um Hospital ou Centro de Controle de Intoxicações para tratamento dos sintomas. Os sinais vitais, a função respiratória e os eletrólitos do sangue devem ser monitorados.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.**

MS: 1.5167.0020

Farmacêutico Responsável: Paulo Fernando Bertachini - CRF-GO nº 3.506

**Fabricado por:**

Aurobindo Pharma Limited  
Patancheru, Telangana State – Índia

**Importado por:**

Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.  
Via Principal 06E, Qd. 09, Md. 12-15, DAIA  
Anápolis-Goiás  
CNPJ: 04.301.884/0001-75  
Indústria Brasileira



**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**



Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 17/05/2017.

P1515435

## Histórico de alteração da Bula

Dados da Submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº Do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
24/03/2014	0215691141	10459 – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	24/03/2014	0215691141	10459 – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	24/03/2014	Atualização de texto de bula conforme bula padrão publicada no bulário. Submissão eletrônica para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.	VP	Cápsulas 500mg
06/10/2014	0885334147	(10452) - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/10/2014	0885334147	(10452) - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/10/2014	<b>II – INFORMAÇÕES AO PACIENTE</b> 4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5.ONDE, COMO E OR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?  <b>II) – INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b> 5.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES, 7.CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO.  Para adequação à última versão da bula do medicamento referência disponibilizada no Bulário Eletrônico da ANVISA.	VP	Cápsulas 500mg
26/01/2017	01390774171	10452) - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	26/01/2017	01390774171	10452) - GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	26/01/2017	<b>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?;</b> <b>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO;</b>  DIZERES LEGAIS	VP/VPS	Cápsulas 500mg
14/08/2017		10452) - GENÉRICO – Notificação de	14/08/2017		10452) - GENÉRICO – Notificação	14/08/2017	<b>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO ?</b>	VP	Cápsulas 500 mg

		Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12			de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--