

## **Spascupreel®**

Citrullus colocynthis D4 + ASSOCIAÇÃO

### **MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO**

#### **APRESENTAÇÃO**

Comprimidos sublinguais de 301,5 mg – Frasco com 50 comprimidos.

#### **VIA ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém: 30 mg de Citrullus colocynthis D4 trit.; 30 mg de Ammonium bromatum D4 trit.; 30 mg de Atropinum sulfuricum D6 trit.; 30 mg de Veratrum album D6 trit.; 30 mg de Magnesium phosphoricum D6 trit.; 30 mg de Gelsemium sempervirens D6 trit.; 15 mg de Passiflora incarnata D2 trit.; 15 mg de Agaricus D4 trit.; 15 mg de Chamomilla recutita D3 trit.; 15 mg de Cuprum sulfuricum D6 trit. e 60 mg de Aconitum napellus D6 trit.. Excipientes: estearato de magnésio e lactose.

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

##### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Spascupreel é indicado como auxiliar no tratamento das cólicas dos órgãos de musculatura lisa, como estômago, intestino, vesícula biliar, útero e do trato urinário; e nos espasmos da musculatura estriada.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

##### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

A aplicação do medicamento anti-homotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

##### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, inclusive aos componentes botânicos como a Chamomilla ou da família das compositae.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Durante a lactação não use este medicamento sem orientação do seu médico.**

##### **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento contém LACTOSE. Se você tem intolerância à lactose suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico. A intolerância à lactose pode provocar problemas gastrintestinais, ou ainda, um efeito laxante.**

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

##### **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

## Texto de Bula para o Paciente - Spascupreel® Comprimidos

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

O comprimido de Spascupreel é branco, podendo ocasionalmente existir pontos marrons amarelados, redondo, de superfícies planas, levemente adocicado e inodoro.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento é de uso oral. Você deve colocar o comprimido embaixo da língua para ser dissolvido.

Para o uso correto do medicamento, siga corretamente a orientação abaixo, ou a prescrição do seu médico.

**Dose recomendada para crianças e adultos:** 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, tomar 1 comprimido a cada 15 minutos, por um período de 2 horas.

Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou cirurgião-dentista.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Este medicamento contém algumas substâncias em baixas dinâmizações e, portanto, algumas reações indesejáveis podem ocorrer.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico, ou o farmacêutico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MS: 1.6198.0002.001-9

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR nº 30.165

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

**Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 19/02/2019.

