

Euphorbium compositum SN  
Euphorbium D3 + ASSOCIAÇÃO

## MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução gotas – Frasco com 30 ml – 18 gotas/ml.

### VIA ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

30 ml contêm: 286,6 mg de Euphorbium D3; 286,6 mg de Pulsatilla pratensis D2; 286,6 mg de Luffa operculata D6; 286,6 mg de Hydrargyrum biiodatum D8; 286,6 mg de Hepar sulfuris D10 e 286,6 mg de Argentum nitricum D10, em solução alcoólica 35% (vol.).

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Euphorbium compositum SN solução é indicado como auxiliar no tratamento da sinusite aguda e crônica, com inflamação do sinus maxilar, sinus frontal, sinus etimoidal e sinus esfenóide, catarro nas passagens auditivas e hidropisia do ouvido médio.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

A aplicação do medicamento antihomotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenesia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado sem acompanhamento médico em caso de distúrbio da tireóide.

Este medicamento é contraindicado às pessoas com alergia aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.**

#### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento contém ÁLCOOL. Em virtude do teor alcoólico, Euphorbium compositum SN deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo somente com acompanhamento médico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

## Texto de Bula para o Paciente - Euphorbium compositum SN Sol. Oral

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

Euphorbium compositum SN é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada, com odor e sabor alcoólico.

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é de uso oral. Você deve tomar Euphorbium compositum SN solução oral com um pouco de água.

Para o uso correto do medicamento, siga corretamente a orientação abaixo, ou a prescrição do seu médico.

**Adultos:** Em geral, tomar 10 gotas, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, iniciar com 10 gotas a cada 15 minutos e reduzir para 10 gotas 6 vezes ao dia, ou de acordo com a prescrição do seu médico.

**Crianças:** a dosagem pediátrica deve seguir a tabela abaixo

<b>Grupo etário</b>	<b>Dosagem normal</b>	<b>Dosagem aguda</b>
Crianças de 1 – 6 anos	5 gotas com um pouco de água, 3 vezes ao dia.	Ingerir com um pouco de água 5 gotas a cada meia hora ou uma hora, até 12 vezes ao dia.
Crianças de 6 – 12 anos	7 gotas com um pouco de água, 3 vezes ao dia.	Ingerir com um pouco de água 7 gotas a cada meia hora ou uma hora, até 12 vezes ao dia.
Adolescentes acima de 12 anos	Dosagem de adulto	Dosagem de adulto

Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula. Use o medicamento dentro do prazo de validade.**

### O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento contém algumas substâncias em baixas dinamizações e, portanto, algumas reações indesejáveis podem ocorrer.

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico ou o farmacêutico.

Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento seja eficaz.

Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.

Não se automedique, pode ser prejudicial à sua saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

MS: 1.6198.0008.002-1

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR nº 30.165

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

**Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 19/02/2019.

